

SABÍA
QUE...

Albendazol (Eskazole) es un antiparasitario de amplio espectro, que se usa para el tratamiento de muchas infecciones, entre ellas, formas adultas en equinocosis (enfermedad hidatídica) y neurocisticercosis. También se utiliza en el tratamiento de quistes de equinococcos tanto hepáticos como pulmonares o peritoneales



Cómo debo tomarlo



Tanto la dosis como la duración del tratamiento son muy variables, en función del tipo de infección y del peso del paciente. Generalmente, se divide la dosis total en dos tomas diarias y es importante para el éxito del tratamiento que el intervalo de 12 horas sea lo más aproximado posible

Administrar el comprimido por vía oral, con un buen desayuno y una buena cena, que tengan suficiente contenido graso como para que el fármaco llegue a sangre en la cantidad adecuada. Por ello, es muy importante que se tome junto con una comida consistente para que haga su acción

Se pueden masticar o triturar en caso de problemas para tragar.

¿Qué hacer si se me olvida una dosis?

Tómesela tan pronto como sea posible pero, si ya han pasado más de seis horas, espere a la siguiente toma

NUNCA tome una dosis doble para compensar una olvidada

No tomar si...

Tiene alergia a albendazol o derivados o a alguno de sus excipientes (amarillo anaranjado S)

Está embarazada o en periodo de lactancia. Se debe evitar el embarazo incluso hasta un mes después de acabar el tratamiento

Precauciones

En caso de insuficiencia hepática grave, anemia o problemas de retina.

Su médico le podrá solicitar controles periódicos para el hígado, sobre todo en tratamientos largos

También puede pedirle pruebas para ver la cantidad de glóbulos rojos y blancos

Contiene como excipiente lactosa

Efectos adversos

En general, se tolera bien aunque podría aparecer:

- Dolor de cabeza, sobre todo en la neurocisticercosis
- Dolor de barriga
- Náuseas o vómitos
- Estreñimiento

Póngase en contacto con su médico si observara coloración amarillenta en la piel u ojos, orina de color parduzca o dolor de estómago que no cede. En cualquier caso, póngase en contacto con él ante cualquier síntoma raro que note

Interacciones con otros fármacos

Albendazol es capaz de interactuar con otros fármacos pudiendo ver disminuido su efecto o llegando a ocasionar eventos indeseados. A modo de ejemplo, podría interactuar con:

Algunos antiepilépticos (carbamecepina, oxcarbacepina, fenobarbital o fenitoína)

Algún antibiótico (rifampicina), antifúngicos azólicos y determinados citostáticos

Algunos corticoides como dexametasona

Sustancias naturales como el ginseng y el zumo de pomelo

Praziquantel: si tuviese que tomar ambos juntos, igual le modificasen las dosis

**No olvide consultar a su farmacéutico o médico
si le recetan algún tratamiento nuevo**