

SABÍA QUE...

Benralizumab es un anticuerpo monoclonal que se une a la IL-5 evitando la diferenciación y activación de eosinófilos, células inmunitarias que están en gran número en sangre y pulmones en el asma llamada eosinofílica. Está indicado en el tratamiento del asma grave en adultos con mal control de la enfermedad a pesar de la administración de beta-adrenérgicos de acción prolongada y corticoides inhalados en dosis altas. Al disminuir el número de eosinófilos mejorará la función pulmonar y prevendrá posibles ataques.

El **objetivo** es prevenir los síntomas tanto en reposo como tras ejercicio, mantener una función pulmonar lo más normal posible y evitar restricciones en la vida diaria

Presentaciones y posología

Se presenta en jeringas precargadas o plumas de 30 mg. Las 3 primeras inyecciones se administran cada 4 semanas y con posterioridad las inyecciones de 30 mg se administran cada 8 semanas. De todas formas atégase siempre a lo que le indique su médico.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Adminístreselo lo antes posible. En la próxima revisión coménteselo a su médico o farmacéutico. **No doble nunca la dosis.**

Consejos:

- Vigilar la tensión arterial al menos al principio del tratamiento
- Consulte siempre a su médico en caso de tener que ponerse alguna vacuna o si le van a realizar una intervención quirúrgica o dental
- Es muy importante que se haga sus analíticas y vaya a sus revisiones con la frecuencia que su médico le indique
- El tabaco puede provocar tanto que empeore la enfermedad como fracaso al tratamiento
- Es importante también que siga hábitos saludables y realice ejercicio físico moderado
- Si pretende quedarse embarazada informe a su médico o farmacéutico

No usar en caso de:

- Alergia a benralizumab o alguno de sus componentes
- Si padece una infección activa grave (infección urinaria, infección de piel,...) o una infección por parásitos no debe empezar el tratamiento
- Debe asegurarse de no padecer tuberculosis ni hepatitis B latentes. Le harán las pruebas necesarias, ya que si fuese así correría riesgo de infección grave
- Presentar alguna reacción alérgica al látex




¿Cómo se administra?

- La vía de administración de Fasentra es **subcutánea**
- Las mejores zonas para la inyección son aquellas en las que la piel es blanda y suave, lejos de articulaciones, nervios o huesos, como por ejemplo, abdomen (evitando el área de 5 cm que rodea el ombligo), brazo, muslo o nalgas
- Desinfecte la zona de la piel donde vaya a inyectarse
- Alterne el punto de inyección y anótelos
- No utilice regiones de la piel con hematomas, doloridas, infectadas o si presentan una herida abierta

Es importante preparar la medicación en un espacio limpio y llevar a cabo los preparativos con **tranquilidad**, sin prisas. Recuerde también que antes de la administración debe dejar la jeringa fuera de la nevera unos 20-30 minutos. NO utilice ninguna FUENTE DE CALOR para ello

PLUMA: Sitúe el protector de la aguja de Fasentra® contra su piel en un ángulo de 90°. Presione hacia abajo firmemente. Oirá un click, que le indica que la inyección ha empezado. Mantenga firmemente presionado durante 15 segundos. Oirá un segundo click, que indica que la inyección ha terminado. Retire la pluma con cuidado y deséchela en el contenedor..



Posibles efectos adversos que pueden aparecer

- Reacción en el lugar de inyección (enrojecimiento, picor, dolor, hinchazón) pero suele desaparecer después del primer mes.
- Dolor de cabeza, dolor de espalda
- Congestión nasal, faringitis, infección respiratoria

Avise a su médico ante la aparición de síntomas de alergia o cualquier otro efecto grave que notase.

Interacciones con otros fármacos

El potencial de interacciones farmacológicas con benralizumab se considera bajo. Informe a su farmacéutico o médico si utiliza otros medicamentos o plantas medicinales.

Este medicamento se lo han prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos