

SABÍA
QUE...

Cladribina es un análogo de nucleósidos con efectos inmunomoduladores selectivos a largo plazo. Actúa provocando una regeneración de los linfocitos, frenando de esa forma el daño neuronal en pacientes con esclerosis múltiple remitente-recurrente.

¿ Cómo debo tomarlo ?

La dosis acumulada es de 3,5 mg/kg dividida en dos cursos de tratamientos en dos años consecutivos (1,75 mg/kg aproximadamente al año). O sea el número de comprimidos a tomar dependerá del peso del paciente

A su vez, cada año de tratamiento también se divide en dos cursos de 4 o 5 días: uno al inicio del primer mes y otro al inicio del segundo mes.

SU MÉDICO le indicará el número de comprimidos a tomar cada día del ciclo

Los comprimidos deben tragarse enteros, con un vaso de agua, sin masticar ni chupar en la boca, ni disolverlos. Tomar inmediatamente tras sacar de su envase. Si deja el comprimido sobre una superficie ésta debe limpiarse después.. Lávese bien las manos también si lo manipula.

	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5
Comprimidos	2	2	1	1	1

En el caso de dosis altas (a partir de 8 comprimidos) en el segundo ciclo de cada año debe tomar generalmente un comprimidos menos.

¿Qué hacer si ha olvidado una dosis?

Debe tomarla en cuanto se acuerde. NUNCA tomarla JUNTO a la siguiente.

Si se olvida un día entero o se acuerda ya próximo a la siguiente toma, deberá seguir con su pauta y ampliar el número de días de esa semana. Si se olvidaran dos, actuar igual y ampliar en dos días.

Embarazo o lactancia

Usted no debe quedarse embarazada ni amamantar a su hijo mientras esté en tratamiento. **TANTO HOMBRES COMO MUJERES** deben usar métodos anticonceptivos eficaces durante, y hasta SEIS MESES después, de la última dosis de cladribina.

En caso de utilización de anticonceptivos orales debe añadir también algún método de barrera durante el tratamiento y hasta cuatro semanas después.

Otras contraindicaciones y precauciones:

Es alérgico al principio activo o algún excipiente.

Infecciones crónicas como VIH, hepatitis o tuberculosis activa

Pacientes con tratamiento inmunosupresor o con neoplasia maligna activa

Insuficiencia renal moderada o grave e insuficiencia hepática

Intolerancia a la fructosa, ya que contiene sorbitol

Consulte siempre antes de cualquier vacunación

Efectos adversos

En general se tolera bastante bien, pero hay descritos algunos efectos adversos:

- Erupciones cutáneas y posible alopecia reversible
- Mayor frecuencia de algunas infecciones, sobre todo herpes zóster

Su médico además le solicitará controles periódicos, sobre todo al inicio, para comprobar cómo están sus defensas.

Informe a su médico si presenta síntomas que indiquen infección

Interacciones con otros medicamentos:

Cladribina tiene pocas interacciones con otros medicamentos:

Fármacos inmunosupresores como ciclosporina, azatioprina, ...

Fármacos que puedan alterar su absorción como eltrombopag

Inhibidores potentes de los transportadores ENT1 y CNT3 como nimodipino, cilostazol, aunque no está clara su repercusión

Y en cualquier caso **SÍ DEBE ESPACIAR** la toma de Mavenclad al menos **TRES HORAS** de cualquier otro medicamento.

En cualquier caso informe a su farmacéutico o médico si le prescriben algún medicamento o preparado medicinal nuevo.