

SABÍA QUE...

Este colirio contiene **atropina** a dosis bajas, un fármaco anticolinérgico que bloquea los receptores μ scarínicos que modulan el crecimiento ocular. Usado vía oftálmica, y por un mecanismo no conocido totalmente, frena la progresión de la miopía. Y al tratarse de dosis tan diluidas no tiene apenas efectos secundarios.

Por lo general, la miopía infantil se diagnostica en niños de entre 3 y 5 años. Con frecuencia, la visión empeora durante los años de crecimiento acelerado y se nivela aproximadamente a los 12 años. Tiene un componente hereditario, pero es importante cuidar los aspectos higiénicos


¿Cómo administrarlo?

- Vía oftálmica.

- La dosis recomendada es una gota de colirio de atropina en ambos ojos **una vez al día**, a la hora de acostarse, aunque su médico podría indicarle otra pauta.

¿Cómo debo aplicarlo?

- ✓ Lávese las manos
- ✓ Incline la cabeza hacia atrás y mire hacia arriba.
- ✓ Tire hacia abajo del párpado inferior para hacer un saco.
- ✓ Aproxime el cuentagotas al saco conjuntival sin tocarlo para evitar contaminarlo.
- ✓ Aplique en el saco la cantidad exacta.
- ✓ Parpadee un par de veces para extender las gotas por toda la superficie ocular
- ✓ Cierre el ojo durante unos dos minutos. No lo cierre demasiado fuerte
- ✓ Recuerde espaciar al menos 5-10 minutos la administración de algún otro colirio.



No es necesario instilarse más de una gota en el (los) ojo(s) afectados.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Intente que no se olvide ninguna dosis recurriendo a alarmas o cualquier otro método, pero si así ocurre espere ya a la noche siguiente.

NO SE PONGA NUNCA UNA DOSIS DOBLE para compensar la que olvidó.

NO utilice atropina colirio si ...

- ES USTED ALÉRGICO AL PRODUCTO O ALGUNO DE SUS EXCIPIENTES.

Precauciones:

- 1) En niños con algún problema cardiaco. La absorción sistémica es muy baja, pero no obstante consúltelo con su médico
- 2) Si utiliza lentes de contactos nocturnas para la misma indicación, es preferible aplicar el colirio unos diez minutos antes y posteriormente la lente
- 3) Es importante que acuda a todas su revisiones

Interacciones de la ciclosporina con otros medicamentos:

A pesar de sus propiedades anticolinérgicas no se prevén efectos secundarios dada la insignificante absorción sistémica

Si está en tratamiento con varios colirios a la vez se recomienda esperar unos 10 minutos entre la administración de uno y otro. Si además se pone una pomada oftálmica póngase primero el colirio y a los 10 minutos la pomada.

Reacciones adversas:

Las **reacciones adversas más frecuentes, que no tienen por qué producirse**, son muy raras, afectan sólo al 1% de los niños tratados y consisten en un leve enrojecimiento y picor alrededor del ojo.

A veces se podría notar cierta dilatación de la pupila que implica algo de fotofobia, pero por lo general es aceptablemente tolerada.

A veces también podría notas alguna dificultad para enfocar de cerca

Informe a su médico si tiene alguno de los estos síntomas.

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente. NO debe ser utilizado por otras personas, aunque presente sus mismos síntomas, podría perjudicarle.