

SABÍA
QUE...

Clorhexidina es un antiséptico de amplio espectro, del grupo de las biguanidas y con acción, entre otros muchos gérmenes, frente a *Acanthamoeba* spp, germen que provoca queratitis cuando infecta el ojo. Es activo tanto frente a las formas quísticas como frente a los trofozoítos


Posología

La dosis puede variar en función del tipo de infección, aunque se suele indicar en intervalos de 1-2 horas los primeros días. En cualquier caso atégase a la dosis prescrita por su médico. A veces se utiliza combinado una diamidina como la propamida y suelen ser tratamientos largos.

Avise a su médico si no nota mejoría en los 2-3 primeros días

¿Cómo administrarlo?

- Lávese bien las manos y atempere el colirio con las manos. Sin utilizar ninguna fuente externa de calor
- Incline la cabeza hacia atrás y mire arriba.
- Tire hacia abajo del párpado inferior para hacer un saco.
- Aproxime el cuentagotas al saco conjuntival **sin tocarlo** para evitar contaminarlo.
- Aplique en el saco la cantidad exacta.
- Parpadee un par de veces para extender las gotas por toda la superficie
- Cierre el ojo durante uno o dos minutos. No lo cierre demasiado fuerte.



¿Qué hacer si se me olvida una dosis?

Póngasela tan pronto como sea posible, pero si ya está cerca de la siguiente toma espere a ésta. No se administre una dosis doble para compensar las olvidadas.

No usar si:

Si tiene alergias a clorhexidina o a alguno de sus excipientes.

Precaución en:

Puede causar, sobre todo al principio, visión borrosa. Tenga precaución si tiene que conducir o manejar maquinaria peligrosa.

Se aconseja un seguimiento cuidadoso de aquellos pacientes que padezcan ojo seco y que utilicen el producto durante periodos prolongados; o en aquellas condiciones en las que la córnea esté comprometida

No utilizar **lentes de contacto** durante el tratamiento.

No debe haber problema, pero si está o puede estar embarazada o si está en periodo de lactancia, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

Efectos adversos

En general se tolera bien y son transitorios. Los más frecuentes son los siguientes:

- escozor o quemazón en el ojo
- Visión borrosa
- Lagrimeo
- Sensación de cuerpo extraño en el ojo.

Interacciones

- ❖ Si está en tratamiento con varios colirios a la vez se recomienda esperar unos 5 minutos entre la administración de uno y otro.
- ❖ Si además se pusiera una pomada oftálmica póngase primero el colirio y a los 10 minutos la pomada.

Conservar en lugar seco y una vez abierto en la nevera

Este colirio tiene una caducidad de 30 días, que serán 15 una vez abierto

Deseche el frasco si observa un color amarillento o presencia de partículas

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos