

SABÍA
QUE...

Dantroleno (Dantrium®) es un relajante muscular usado en el tratamiento de la espasticidad muscular (rigidez y espasmos) causada por diferentes patologías, tales como lesión traumática medular, accidente cerebrovascular, parálisis cerebral o esclerosis múltiple. También como profilaxis de hipertermia maligna en pacientes de riesgo, e intravenosa en el tratamiento de ésta.

Posología y forma de administración

Se administra por vía oral y la dosis dependerá de cada paciente. Se empezará con dosis bajas, **de 25 mg al día**, e irán aumentándola en periodos semanales. La dosis final dependerá de la respuesta clínica y la tolerancia del paciente hasta una dosis máxima de 400 mg al día, dividida en cuatro tomas de 100 mg. Salvo dosis total muy pequeña se distribuirá en 3-4 tomas diarias

Para la prevención de hipertermia maligna, tanto de niños como de adultos en riesgo (historial familiar), se administrarán dosis orales de 4-8mg/kg diarias repartidas en 3 ó 4 tomas durante dos días antes de la cirugía. La última dosis debe ser administrada 3 ó 4 horas antes de la cirugía.

Trague las cápsulas enteras con agua, sin abrirlas ni morderlas.

Qué hacer si ha olvidado una dosis

Tómela tan pronto como sea posible y siga con su pauta normal. **NO TOME** una dosis DOBLE para compensar las dosis olvidadas.

No utilizar en...

- Si presenta hipersensibilidad a dantroleno o a alguno de los excipientes.
- Cuando la espasticidad es fundamental para mantener el equilibrio erguido
- En pacientes con problemas hepáticos
- Si está embarazada o plantea quedarse embarazada. Y durante la lactancia. En cualquier caso su médico valorará los riesgos y los beneficios

Precauciones

- En caso de enfermedad cardiovascular o respiratoria grave
- Las persona mayores son más sensibles de sufrir daño hepático
- Puede provocar somnolencia, con lo que debe tener precaución si conduce o maneja maquinaria peligrosa. Al menos al principio del tratamiento
- Protéjase del sol sobre todo en exposiciones prolongadas
- Las cápsulas de Dantrium® contienen lactosa
- **No olvide** acudir a hacerse las analíticas de control indicadas

Reacciones adversas

Los efectos adversos más frecuentes en adultos son:

- Mareos o sueño
- Debilidad y cansancio
- Diarrea

Si notase que estos efectos secundarios fueran excesivos consulte a su médico. Igualmente ante cualquier otro efecto adverso que pudiera aparecer como somnolencia grave, convulsiones o dificultad para respirar, póngase en contacto con su médico.

Comunique también si apareciera color amarillento en los ojos o piel, orina más oscura de lo normal y/o dolor abdominal persistente.

Interacciones con otros fármacos

Tomar dantroleno con otros fármacos que puedan causar somnolencia y depresión del SNC que puede ser grave. También debe tener precaución en la toma conjunta con otros medicamentos que puedan afectar al hígado.

Consulte siempre a su farmacéutico o médico ante otra medicación o planta medicinal que vaya a tomar