

SABÍA QUE...

Ixekizumab (Taltz®) es un anticuerpo monoclonal humanizado recombinante de tipo IgG4 que se une con alta afinidad y de forma específica a la IL-17A. Concentraciones elevadas de IL-17A se asocian con la patogénesis de la psoriasis. La neutralización de la IL-17A por ixekizumab inhibe estas acciones. Como consecuencia directa, se reduce el eritema, así como la induración y descamación presente en las lesiones de la psoriasis en placas. El objetivo del tratamiento es, además de aliviar la inflamación y el dolor, parar el curso de la enfermedad, por lo que es importante que no olvide ninguna toma.

Presentaciones y posología

Ixekizumab (Taltz®) se presenta en plumas precargadas.

La dosis va a depender de la patología, pero lo habitual en **psoriasis** es:

- **Semana 0:** 160 mg (**dos inyecciones** de 80 mg)
- **Semanas 2, 4, 6, 8, 10 y 12:** 80 mg (**una sola inyección**)
- **A partir de la semana 13:** Una dosis de mantenimiento de 80 mg cada cuatro semanas.

La pauta de administración puede variar de un paciente a otro, por lo que debe seguir exactamente las instrucciones dadas por su médico.

En **artritis psoriásica y espondilitis** la pauta de inicio es:

- **Semana 0:** 160 mg (**dos inyecciones** de 80 mg)
- **A partir de la semana 4:** 80 mg (**una sola inyección**) cada 4 semanas

No usar en caso de :

- Alergia a ixekizumab o alguno de sus componentes.
- Si padece una infección activa.
- Debe asegurarse de no padecer tuberculosis ni hepatitis B latentes. Le harán las pruebas necesarias, ya que si fuese así correría riesgo de infección grave.
- En caso de embarazo ni en caso de lactancia.
- Precaución en pacientes con trastornos psiquiátricos graves

Consejos:

- Consulte siempre a su médico en caso de tener que ponerse alguna **vacuna** o si le van a realizar una **intervención quirúrgica** o dental.
- Es muy importantes que se haga sus analíticas y vaya a sus revisiones con la frecuencia que su médico le indique.
- El tabaco puede provocar tanto que empeore la enfermedad como fracaso al tratamiento.

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.

Es importante que prepare la medicación en un espacio limpio y lleve a cabo los preparativos con **tranquilidad**, sin prisas. Y recuerde también que antes de la administración debe dejar la jeringa fuera de la nevera alrededor de media hora. **NO** utilice NINGUNA FUENTE DE CALOR para ello

¿Cómo se administra?

La vía de administración de Taltz es **subcutánea**.

- Las mejores zonas para la inyección son aquellas en las que la piel es blanda y suave, y lejos de articulaciones, nervios o huesos. Por ejemplo, abdomen (evitando el área de 5 cm que rodea el ombligo), brazo, muslo o nalgas.
- Desinfecte la zona de la piel donde vaya a inyectarse.
- Alterne el punto de inyección y anótelos.
- No utilice regiones de la piel con hematomas, doloridas, infectadas o si presentan una herida abierta.



Siga exactamente las instrucciones del prospecto y tras la administración presionar con un algodón el sitio de inyección durante unos segundos y **no frotar**.

Si olvida una inyección, póngase la siguiente tan pronto como lo recuerde. Si se ha retrasado menos de 1 semana debe administrarse la dosis olvidada y mantener el calendario habitual. Si ha pasado más de 1 semana, póngase la dosis olvidada y establezca un nuevo calendario a partir de la nueva fecha. Nunca se administre una dosis doble (dos dosis el mismo día) para compensar dosis olvidadas.

Posibles efectos adversos que pueden aparecer

- Riesgo aumentado de infecciones leves: candidiasis oral, conjuntivitis, infecciones de vía respiratoria superior o tiñas. En caso de infecciones graves se debe interrumpir el tratamiento y reanudarlos una vez resueltos. En cualquier caso consulte a su médico al respecto.
- Reacciones en el lugar de inyección (inflamación, dolor y enrojecimiento)
- Dolor de garganta
- Náuseas

Consulte a su médico si presenta síntomas como erupción cutánea grave, fiebre persistente, cansancio generalizado, heridas que no cicatrizan o problemas dentales.