

[Conservación]

Conservar por debajo de 30°C en lugar seco

No utilizar después de la fecha escrita en el envase.

{ Advertencias }

Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Devuelva la medicación sobrante a la Farmacia del Hospital.

Este díptico **NO** contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento.

Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico.

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarlo aunque tenga síntomas similares a los suyos.

Ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor (Kaftrio®)



SERVICIO DE FARMACIA Orientación sobre el medicamento



954782335

Horario de atención de 8.30 a 14:30



HORARIO DE RECOGIDA

MAÑANA

DE LUNES A VIERNES

TARDE

LUNES a JUEVES

8.30 – 14.30

16.00 – 19.00

SABÍA QUE...

Sobre su enfermedad

La fibrosis quística es una enfermedad crónica, hereditaria y degenerativa que afecta principalmente a los pulmones y el sistema digestivo.

Consiste en una alteración genética que afecta a las zonas del cuerpo que producen secreciones, dando lugar a un espesamiento y disminución del contenido de agua, sodio y potasio, originándose una obstrucción de los canales que transportan esas secreciones y permitiendo que dicho estancamiento produzca infecciones e inflamaciones.

Sobre su medicación

Ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor Kaftrio® en administración combinada con ivacaftor (Kalydeco®) está indicado en el tratamiento de pacientes con fibrosis quística (FQ) mayores de 6 años o mayores homocigotos para la mutación *F508del* en el gen CFTR.

Cómo tomarlo

Siga las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico según edad y peso del paciente.

Edad	Dosis de la mañana	Dosis de la noche
6 a <12 años que pesan <30 kg	2 comprimidos de 37,5 mg de ivacaftor/25 mg de tezacaftor/50 mg de elexacaftor	1 comprimido de 75 mg de ivacaftor
6 a <12 años que pesan ≥30 kg	2 comprimidos de 75 mg de ivacaftor/50 mg de tezacaftor/100 mg de elexacaftor	1 comprimido de 150 mg de ivacaftor
≥12 años	2 comprimidos de 75 mg de ivacaftor/50 mg de tezacaftor/100 mg de elexacaftor	1 comprimido de 150 mg de ivacaftor

Tanto **Kaftrio®** como **Kalydeco®** se deben administrar por vía oral con alimentos con suficiente contenido graso: Se deben tomar una comida o un aperitivo que contenga grasas, justo antes o justo después de la administración. Es importante que el intervalo entre los comprimidos de la mañana y de la noche sea de 12 horas.



Debe evitar el zumo de pomelo si está en tratamiento con ivacaftor.

No debe tomar Kalydeco® si es **alérgico** a ivacaftor o alguno de sus excipientes

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

- Si se olvida una dosis y han transcurrido menos de 6 horas desde la hora a la que normalmente se lo toma debe tomar el comprimido lo antes posible y después seguir con el horario habitual.
- Si han transcurrido **más de 6 horas**:
 - Si olvidó la dosis de la mañana de Kaftrio®, tómela en cuanto se acuerde. Si ha pasado mucho tiempo y no la toma, no tome tampoco la dosis de ivacaftor de la noche. Tome la siguiente dosis de la mañana a la hora habitual.
 - Si olvidó la dosis de ivacaftor de la noche, no tome la dosis olvidada. Espere al siguiente día y tome la dosis de la mañana de Kaftrio® a la hora habitual.

NUNCA TOME UNA DOSIS DOBLE PARA COMPENSAR LA DOSIS OLVIDADA.

Reacciones adversas

Se suele tolerar bien, pero las más frecuentes que pueden aparecer son:

- Mareos (evitar conducir o manejar maquinaria peligrosa si se producen)
- Cefaleas y dolor de oído
- Congestión nasal
- Dolor abdominal
- Exantema (si notase erupción grave póngase en contacto con su médico)

Precauciones

Consulte a su médico si le han dicho que tiene enfermedad hepática o renal, ya que podrá ser necesario que su médico le ajuste la dosis de Kaftrio®.

Interacciones

Este fármaco tiene interacciones con determinados medicamentos, como ciertos antibióticos, anticonvulsivantes, antimicóticos, antimicobacterianos, anticonceptivos hormonales, inmunosupresores, hierba de san Juan, antiarrítmicos, anticoagulantes, hipoglucemiantes orales, hipolipemiantes o antihipertensivos.

Evite los alimentos o bebidas que contengan pomelo, ya que pueden aumentar los efectos adversos de Kaftrio®.

Es muy importante que consulte a su farmacéutico o médico antes de tomar un nuevo medicamento, complejo vitamínico o planta medicinal.