

SABÍA
QUE...

Sobre su medicación

Pitolisant es un medicamento que actúa sobre los receptores H3 de la histamina. Se utiliza en pacientes adultos con narcolepsia diurna con o sin cataplejía (debilidad muscular súbita y pasajera debida a una fuerte respuesta emocional). Actúa sobre receptores cerebrales implicados en el estado de alerta, evitando esa somnolencia diurna excesiva y la cataplejía, cuando han fracasado otros tratamientos como modafinilo u oxibato. También tiene indicación en apnea obstructiva del sueño (AOS).

Presentación y forma de administración:

Se presenta en dos dosis distintas, Wakik de 4,5 mg y Wakik de 18 mg

Se debe administrar con la dosis efectiva más baja, en función de la respuesta y la tolerancia de cada paciente, subiendo la dosis poco a poco sin superar la dosis de 36 mg/día. En general se sigue esta pauta de ascenso, pero en cualquier caso atégase a lo que indique su médico.

- Semana 1: dosis inicial de 9 mg (dos comprimidos de 4,5 mg) al día.
 - Semana 2: se puede aumentar la dosis a 18 mg (un comprimido de 18 mg) al día o disminuir a 4,5 mg (un comprimido de 4,5 mg) al día.
 - Semana 3: se puede aumentar la dosis a 36 mg (dos comprimidos de 18 mg) al día.
- En cualquier momento se puede disminuir (hasta 4,5 mg al día) o aumentar (hasta 36 mg al día) la dosis en función de la valoración del médico y la respuesta del paciente.

La dosis diaria total se debe administrar como una dosis única por la mañana durante el desayuno. No se debe tomar una dosis de pitolisant por la tarde, ya que el paciente podría tener dificultades para dormir.

En caso de problemas de riñón su médico también le puede modificar la dosis.

¿Qué hacer si olvida una dosis?

Debe intentar que no se olvide nunca, pero si esto ocurre tómela tan pronto como sea posible; si ya hubiesen transcurrido más de 6 horas espere a la toma siguiente ya que puede interferir con el sueño. **NO TOME UNA DOSIS DOBLE PARA COMPENSAR LAS DOSIS OLVIDADAS.**

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos

Contraindicaciones y precauciones

No usar en caso de alergia al medicamento a alguno de los excipientes.
No debe utilizarse tampoco cuando padece problemas hepáticos graves
Evitar la lactancia materna y consulte a su médico en caso de embarazo.

Precauciones

Precaución en caso de padecer ansiedad frecuente o depresión
Comuníquese si tiene cambios importantes de peso
Si tiene problemas cardiacos
Si padece epilepsia no controlada

Reacciones adversas

En general se tolera bastante bien, pero hay descritos efectos adversos como:

- Dolores de cabeza, vértigo, temblores o cierta pérdida de equilibrio
- Náuseas, vómitos o cansancio
- Sensación de ansiedad o irritabilidad.

Algunas personas con antecedentes psiquiátricos han notificado ideas de suicidio mientras tomaban este medicamento. Informe a su médico de inmediato si se siente deprimido. Pida a un familiar o amigo que le ayude a detectar signos de depresión u otros cambios en su conducta. Si experimenta algún otro efecto importante póngalo en conocimiento de su médico

Interacciones con otros medicamentos

- ✓ Puede reducir la eficacia de los anticonceptivos hormonales, por lo que se tiene que utilizar otro método anticonceptivo seguro.
- ✓ Debido a los problemas gástricos descritos debe evitar en lo posible otros medicamentos que puedan causar daño en el estómago como los antiinflamatorios (AINEs).
- ✓ Hay medicamentos que pueden hacer que pitolisant tenga menos efecto (rifampicina, carbamacepina, hierba de san Juan o ciertos antihistamínicos) y otros que pueden potenciar su efecto como algunos antidepresivos.
- ✓ Y al contrario hay medicamentos que pueden verse afectados en su eficacia por la toma de pitolisant: Digoxina, algunos inmunosupresores, anticoagulantes, morfina o ciertos medicamentos para la diabetes.

Es importante que consulte a su farmacéutico o médico si le recetan algún tratamiento, planta o preparado nuevo