

SABÍA QUE...

Rimegepant es un fármaco del grupo llamado, genéricamente, de los “gepantes”. No está claro el mecanismo de acción exacto pero parece que inhibe de alguna manera un mensajero químico llamado CGRP, que interviene en la aparición de la migraña. Está financiado para la profilaxis de la migraña tanto crónica como episódica en adultos .

OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO

La migraña es una cefalea caracterizada por episodios recurrentes de dolor, de 4 a 72 horas de duración, acompañado de síntomas intestinales y sensitivos. El dolor suele ser de intensidad moderada a grave, unilateral y con punzadas, y empeora con la actividad física. Puede acompañarse de náuseas, fono y fotofobia. Y puede cursar con o sin aura.

Este tratamiento NO cura la enfermedad. El objetivo es preventivo: reducir la frecuencia, intensidad y duración de las crisis, mejorando así la calidad de vida y reduciendo el impacto de la enfermedad en la actividad diaria del paciente

Posología

La pauta habitual **en profilaxis** es de 75 mg cada 48 horas.

Se deposita encima o debajo de la lengua y no es necesario tomar líquidos. Es importante manipular el blíster con las manos secas y debe intentar que sea a la misma hora del día

Siga siempre **las instrucciones de su médico** y recuerde comentar siempre cualquier **medicación nueva** que le receten.

Qué hacer si ha olvidado una dosis

- Debe tomarlo lo antes posible, pero si ya ha pasado mucho tiempo cambie su horario y adáptese al nuevo

NUNCA tome una dosis **doble** para compensar un olvido.

No utilizar en caso de...

- De alergia a rimegepant o cualquiera del resto de componentes de Vydura®

- No se recomienda usar rimegepant durante el **embarazo**

Precauciones

- Pacientes con enfermedad hepática o renal grave.
- En caso de lactancia materna hablelo con su médico y valorar entre ambos los beneficios y los posibles riesgos

Efectos adversos

En general se tolera bien, pero puede presentarse:

- Dolor abdominal
- Náuseas al principio

Si notase algún efectos secundario grave, como dificultad para respirar o hinchazón de la cara, labios, lengua o garganta, **avise a su médico** que podría tratarse de una reacción alérgica

Interacciones

Rimegepant presenta interacciones con bastantes fármacos. A modo de ejemplo:

Algunos antibióticos y antifúngicos (para los hongos)

Ciertos antiepilépticos

Bastantes citostáticos (fármacos para el cáncer)

Antivirales para el VIH

Algún antidepresivo

Plantas medicinales incluso

Inmunosupresores, etcétera

No se ha visto que haya interacción ni con anticonceptivos orales, ni con fármacos usados tanto para el dolor como para las náuseas de las crisis de migraña. Tampoco con protectores de estómago.

Es muy importante que si va a tomar algún medicamento o preparado medicinal nuevo consulte siempre a su farmacéutico o médico ante la posibilidad de aparición de interacciones.

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos