

SABÍA QUE...

Vedolizumab es un anticuerpo monoclonal que bloquea una proteína en la superficie de los glóbulos blancos (leucocitos) que causa la inflamación en la colitis ulcerosa y en la enfermedad de Crohn, de modo que se reduce la inflamación.

Presentación y posología

Se presenta en plumas precargadas de 108 mg y la pauta posológica recomendada de vedolizumab subcutáneo como tratamiento de mantenimiento es de una inyección cada 2 semanas, tras al menos 2 perfusiones por vía intravenosa la primera vez. No obstante su médico puede decidir acortarle o alargarle el intervalo de dosis. Aténgase siempre a lo que le indique.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si se omite una dosis programada de vedolizumab subcutáneo, debe administrarse la siguiente dosis a la mayor brevedad posible y, a partir de entonces, cada 2 semanas.

Contraindicaciones:

No use Entyvio si:

- Alergia a vedolizumab o alguno de sus componentes
- Si padece una infección activa grave (gripe, infección urinaria, infección de piel)
- Debe asegurarse de no padecer tuberculosis latente y estar correctamente inmunizado frente al virus de la Hepatitis B. Le harán las pruebas necesarias al inicio del tratamiento.
- Embarazo o lactancia

Consejos:

- Informe a su médico o farmacéutico inmediatamente si tiene o cree que tiene una infección grave (los signos pueden ser temblores, tos persistente o fiebre alta).
- Consulte siempre a su médico en caso de tener que ponerse alguna vacuna o si le van a realizar una intervención quirúrgica o dental
- Siga una alimentación equilibrada y saludable según le hayan dicho. Por ejemplo evitar alimentos con alto contenido en grasas, alimentos que puedan provocar gases, irritantes, con alto contenido graso, etcétera.
- El tabaco puede provocar tanto que empeore la enfermedad como fracaso al tratamiento.
- Es importante también que evite situaciones de estrés y realice ejercicio físico moderado con frecuencia tal como le hayan dicho.

¡¡NUNCA ABANDONE EL TRATAMIENTO POR SU CUENTA. CONSULTE SIEMPRE!!

Posibles efectos adversos que pueden aparecer

- Infecciones leves del tracto respiratorio (sinusitis, faringitis, mocos...).
- Dolor en las articulaciones.
- Dolor de cabeza.
- Reacciones en el lugar de inyección (inflamación, dolor, enrojecimiento, picor)
- Hipertensión.
- Trastornos gastrointestinales, posiblemente relacionados con la propia patología.
- Consulte a su médico inmediatamente si experimenta visión doble, borrosa o pérdida de visión; dificultades en el habla, problemas de equilibrio, confusión o pérdida de memoria. También en caso de que experimente alguno de los siguientes síntomas: silbidos o dificultad para respirar, habones, picor de la piel, hinchazón, sensación de malestar, escalofríos o temblores, fiebre alta o erupciones.

Como administrar Entyvio:

Es importante que prepare la medicación en un espacio limpio y lleve a cabo los preparativos con **tranquilidad** y sin prisas. Recuerde también que antes de la administración debe dejar la pluma fuera de la nevera alrededor de media hora.



- La vía de administración de Entyvio es **subcutánea**
- Las mejores zonas para la inyección son aquellas en las que la piel es blanda y suave, lejos de articulaciones, nervios o huesos, como por ejemplo, abdomen (evitando el área de 5 cm que rodea el ombligo), brazo, muslo o nalgas. Alterne el punto de inyección y anótelo
- Desinfecte la zona de la piel donde vaya a inyectarse
- No utilice regiones de la piel con hematomas, doloridas, infectadas o si presentan una herida abierta

Pluma: siga las instrucciones del prospecto.

Conservación

- Conservar en nevera, entre 2 y 8 °C
- Conservar la jeringa en su estuche original para protegerla de la luz.
- Sacar de la nevera 30 minutos antes de la administración

Interacciones

Aunque no hay experiencia no se prevén ni se han observado hasta el momento interacciones con otros medicamentos.

Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C). No congelar. Es estable a una temperatura de 25°C durante 7 días (en envase original).