

SABÍA QUE...

La **Hepatitis delta (VHD)** es una de las distintas infecciones que pueden causar daño al hígado por un mecanismo inflamatorio. Esta inflamación interfiere con la función normal del órgano y, si se cronifica, puede producir con el tiempo un endurecimiento de las células (fibrosis) que puede evolucionar a cirrosis, afectando a la capacidad funcional del hígado.

El HDV se conoce como “virus defectivo”, “virus satélite” o “virus incompleto” porque solo puede infectar a personas que también están infectadas con el virus de la hepatitis B, ya que necesita de éste para replicarse.

Bulevirtida bloquea la entrada del VHB y el VHD en los hepatocitos uniéndose e inactivando el NTCP, un transportador de sales biliares que actúa como receptor esencial de la entrada del VHB/VHD.

Posología


La dosis es de 2mg (un vial) al día, aproximadamente a la misma hora y vía **subcutánea**. La duración del tratamiento es variable, en principio es indefinida, pero su médico le puede indicar que lo interrumpa en algún momento según analíticas. **NO ABANDONDE** nunca por su cuenta sin notificarlo.

Preparación

- Debe seguir cuidadosamente la «Guía de inyección paso a paso», incluida en el envase.

- Recuerde:

- Sacar el vial de la nevera, quitar el tapón azul y **desinfectar** con alcohol la superficie
- En el envase viene una **aguja** un poco más grande para introducir el agua estéril, disolver el producto y extraerlo de nuevo y otra más pequeña para inyectarse.
- **No debe agitar fuerte**, se formará espuma y tardará mucho más en disolverse
- Asegúrese de que las agujas están bien **ajustadas** a la jeringa, para ello presione ligeramente mientras la gira en el sentido de las agujas del reloj.
- Bulevirtida totalmente disuelta debe ser **transparente** y sin espuma.
- Una vez disuelto se debe administrar lo antes posible. No es estable más de dos horas



Las mejores zonas para la inyección son aquellas en las que la piel es blanda y suave, y lejos de articulaciones, nervios o huesos. Por ejemplo, abdomen (evitando el área de 5 cm que rodea el ombligo) o muslo. Altere el punto de inyección y anótelos.

Desinfecte la zona de la piel donde vaya a inyectarse.

No utilice regiones de la piel con hematomas, doloridas o dañadas



JERINGA: Introduzca la aguja en su totalidad formando un ángulo de 45° e inyecte de forma lenta y constante.

Es importante preparar la medicación en un espacio limpio y llevar a cabo los preparativos con **tranquilidad**, sin prisas. Y recuerde también que antes de la administración debe dejar la jeringa fuera de la nevera alrededor de media hora. **NO utilice NINGUNA FUENTE DE CALOR** para ello.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

- ✓ Si han transcurrido menos de 4 horas desde la hora programada, la inyección se deberá poner tan pronto como sea posible. Al día siguiente vuelva al horario habitual de administración.
- ✓ Si se ha olvidado una inyección y han pasado más de 4 horas desde la hora programada, no se debe administrar la dosis olvidada. Espere al día siguiente a la hora fijada
- ✓ Si la inyección se realiza por error más de 4 horas después de la hora programada, la siguiente inyección se deberá administrar igualmente de la forma habitual (es decir, conforme al calendario original). Pero debe evitar que esto ocurra
- ✓ **NUNCA** doble una dosis para compensar olvidos

No usar Hepcludex®

En caso de alergia a bulevirtida o alguno de sus excipientes

Posibles efectos adversos que pueden aparecer

Las reacciones adversas notificadas con más frecuencia son el aumento de las sales biliares, picor, cefalea y reacciones en el lugar de inyección (inflamación, dolor, enrojecimiento, ...).

Consulte a su médico si presenta síntomas como erupción cutánea grave, fiebre persistente, cansancio generalizado, heridas que no cicatrizan o problemas dentales.

Interacciones

Se ha demostrado que puede tener interacciones con otros medicamentos que inhiben el NCTP, comprometiendo así su eficacia. Por ejemplo

Estatinas para el colesterol

Algunos medicamentos para el cáncer

Antihistamínicos como fexofenadina

Antidiabéticos

Fármacos para la tensión arterial como valsartan o telmisartán

Bulevirtida puede también ver comprometida su eficacia con medicamentos que aceleran su metabolismo como ciclosporina.

No olvide consultar a su farmacéutico o médico si le recetan algún tratamiento o preparado nuevo