

SABÍA
QUE...

Avatrombopag es un agonista del receptor de trombopoyetina, utilizado para tratar la trombocitopenia (falta de plaquetas en la sangre). Está indicado en adultos con enfermedad crónica del hígado que estén programados para someterse a un procedimiento quirúrgico.

También se usa para tratar la trombocitopenia inmune primaria (TPI) crónica cuando otros tratamientos han fallado.

Avatrombopag no cura la trombocitopenia. El **objetivo del tratamiento** es mantener una cifra de plaquetas adecuada y evitar así problemas de coagulación y el consiguiente riesgo de sangrado

Posología y forma de administración

1) Antes de una intervención quirúrgica:

• Serán ciclos de **5 días**, que empezarán entre el día 10 a 13 antes de la intervención y acabarán, según inicien, entre el día 5 y 8 antes de la intervención. La dosis dependerá siempre del recuento de plaquetas.

2) TPI crónica

• Se iniciará con 20 mg al día y se irá ajustando posteriormente según los niveles de plaquetas en sangre. Al principio y tras cualquier cambio de dosis los controles del número de plaquetas serán más frecuentes (incluso dos veces por semana) y el objetivo es alcanzar una cifra de plaquetas entre 50 y 150 x10⁹/l.

• Las dosis de mantenimiento pueden oscilar entre 40 mg diarios hasta 20 mg semanales

Los comprimidos deben tomarse **con alimentos** y siempre a la misma hora del día, tanto en regímenes de toma diaria o en pautas de solo determinados días de la semana.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si olvida tomar una dosis hágalo lo antes posible, pero en caso de que ya esté próxima la siguiente toma espere y siga su ritmo habitual. **NUNCA DOBLE** una DOSIS para compensar olvidos.

Si olvida una dosis previa a un procedimiento quirúrgico póngase en contacto con su médico.

Si vomita, únicamente repita la dosis si ha transcurrido menos de 1 h desde la toma.

No usar Doptelet:

- * En caso de alergia a avatrombopag o a alguno de los componentes.
- * Intolerancia hereditaria a galactosa, deficiencia total de lactasa o problemas de absorción de glucosa o galactosa
- * Embarazo

Precauciones

- En caso de lactancia debe valorar con su médico los beneficios y los riesgos.
- Las mujeres en edad fértil deben adoptar métodos anticonceptivos seguros.

Efectos adversos:

Los más frecuentes, que no quiere decir que aparezca en todos los pacientes, son:

- ✓ Cansancio
- ✓ Dolor de cabeza o de articulaciones
- ✓ A veces pueden aparecer hemorragias nasales o de encías o pequeños moratones en la piel.

Avisé rápidamente a su médico si tiene:

- Dolor o enrojecimiento de extremidades.
- Palpitaciones, dolor en el pecho, dificultad para respirar.
- Fiebre o escalofríos repentinos.
- Color amarillento en ojos o piel
- Sangre en heces, esputo o vómitos.

Interacciones:

Avatrombopag puede interactuar con otros medicamentos con lo que puede que le haga menos efecto o aparezcan más efectos adversos. Por ejemplo antifúngicos (para infecciones por hongos), ciertos antibióticos, algunos antiepilépticos o ciertos fármacos oncológicos

Consulte siempre con su farmacéutico o su médico ante cualquier fármaco o producto de herboristería que vaya a tomar