

SABÍA QUE...

Risankizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado anti-interleuquina 23 (IL-23), proteína que tiene un papel clave en el desarrollo de enfermedades como la psoriasis, la artritis psoriásica o la enfermedad de Crohn. El objetivo del tratamiento es, además de actuar frente a los síntomas de la enfermedad, parar el curso de la misma, por lo que es importante que siga la pauta prescrita.

Posología:

Risankizumab (Skyrizi®) se presenta en plumas de 150 y 360 mg.

En EEII se inicia con una tres dosis intravenosas (IV) en las semanas 0, 4 y 8.

A las 4 semanas de la última dosis IV se debe poner la primera dosis subcutánea de 360 mg, y a partir de ahí una dosis cada 8 semanas. No obstante esta pauta podría cambiar. La respuesta podría tardar en aparecer hasta 12-16 semanas. También hay disponible una presentación de 180 mg para pacientes con buena evolución. Aténgase siempre a lo que le indique su médico.

No usar en caso de:

- Alergia a Risankizumab o alguno de sus componentes
- Si padece una infección activa (gripe, infección urinaria, infección de piel,...)
- Debe asegurarse de no padecer tuberculosis. Le harán las pruebas necesarias ya que, si fuese así, correría riesgo de infección grave
- En caso de embarazo ni en caso de lactancia

Consejos:

- Consulte siempre a su médico en caso de tener que ponerse alguna vacuna o si le van a realizar una intervención quirúrgica o dental
- Es muy importantes que se haga sus analíticas y vaya a sus revisiones con la frecuencia que su médico le indique
- El tabaco puede provocar tanto que empeore la enfermedad como fracaso al tratamiento
- Es importante también que siga hábitos saludables y realice ejercicio físico moderado con frecuencia tal como le hayan indicado

Posibles efectos adversos que pueden aparecer

- Riesgo aumentado de infecciones leves, sobre todo a nivel de las vías respiratorias altas y de la piel. En caso de infecciones graves, se debe interrumpir el tratamiento y reanudarlo una vez resuelta la infección
- Reacciones en el lugar de inyección (inflamación, dolor, enrojecimiento, picor)
- Fatiga, cansancio
- Cefalea (dolor de cabeza)

Consulte a su médico si le aparecen otro tipo de síntomas



- La vía de administración de Skyrizi es la **subcutánea**
- Las mejores zonas para la inyección son aquellas en las que la piel es blanda y suave, lejos de articulaciones, nervios o huesos. Por ejemplo, abdomen (evitando el área de 5 cm que rodea el ombligo), brazo o muslo
- Desinfecte con alcohol la zona de la piel donde vaya a inyectarse
- Alterne el punto de inyección y anótelos.
- No utilice regiones de la piel con hematomas, doloridas, infectadas o si presentan alguna herida abierta

Recuerde que es importante que prepare la medicación en un espacio limpio y lleve a cabo los preparativos con **tranquilidad** y sin prisas. Recuerde también que antes de la administración debe dejar la jeringa fuera de la nevera alrededor de media hora



Introduzca la aguja en su totalidad formando un ángulo de 45° e inyecte el medicamento de forma lenta y constante. Tras la administración, presionar con un algodón el sitio de inyección durante unos segundos sin frotar

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si olvida una inyección, póngase la siguiente tan pronto como lo recuerde. Si se ha retrasado menos de 2 semanas, puede administrarse la dosis olvidada y mantener el calendario habitual. Si han pasado más de 2 semanas, póngase la dosis olvidada y establezca un nuevo calendario a partir de la nueva fecha

Si usted está tomando también METOTREXATO oral o subcutáneo

Metotrexato reduce la inflamación por un mecanismo relacionado con el metabolismo del ácido fólico. Por eso es importante tomar un suplemento semanal de Ácido Fólico. Y es muy importante tomarlo **24 horas después**

Debe espaciar también 24 horas la administración de Metotrexato y Risankizumab

Se recomienda beber abundante líquido para mantener una buena hidratación

Precaución con el alcohol

Comprimidos: En una sola toma semanal; toma única o repartiéndolos en dos tomas un mismo día. Si manipula el comprimido debe utilizar guantes

Inyectables: Si se derramase por algún motivo una inyección, consulte el prospecto y siga exactamente sus instrucciones. Desechar todo el material en contenedores específicos

Metotrexato **interacciona con bastantes medicamentos**, como por ejemplo, antibióticos, antiinflamatorios o protectores de estómago

Interacciones

Aunque no esté con Metotrexato, consulte cualquier tratamiento nuevo que le prescriban.

Puede tener interacciones con Risankizumab y aparecer efectos adversos indeseados