

SABÍA QUE...

Losartan es un fármaco para la hipertensión, antagonista de la angiotensina-II. En este caso actúa como inhibidor de la señalización del factor de crecimiento transformante β , fundamental en el desarrollo de los microfibriloblastos responsables de la formación de tejido cicatricial.

El tratamiento tópico en forma de colirio está indicado para tratar la formación de opacidad después de lesiones corneales tras procesos infecciosos, quemaduras químicas y complicaciones tras determinadas cirugías.

El **objetivo** último del tratamiento es actuar sobre las fibrosis provocadas por las lesiones en la córnea y así eliminar o disminuir la opacidad que ha provocado la lesión y restaurar la visión. Se suele emplear en segunda línea cuando la lesión no ha respondido al uso de corticoides tópicos

¿Cómo administrarlo?


- Vía oftálmica.

- La dosis habitual es de una gota cada 4-6 horas respetando el sueño, pero puede variar en función del tipo de afección y del momento del tratamiento. En cualquier caso, atégase a la dosis prescrita por su médico.
- No se instile más cantidad de lo que le han indicado, puede ser perjudicial
- La duración del tratamiento puede llevar varios meses para recuperar la mayor parte de visión posible. **NUNCA** interrumpa el tratamiento por su cuenta

¿Cómo debo aplicarlo?

- ✓ Lávese las manos
- ✓ Atempere con las manos el frasco antes de administrárselo, pero no utilice ninguna fuente de calor externa
- ✓ Inclíne la cabeza hacia atrás y mire hacia arriba.
- ✓ Tire hacia abajo del párpado inferior para hacer un saco.
- ✓ Aproxíme el cuentagotas al saco conjuntival **SIN TOCARLO** para evitar contaminarlo.
- ✓ Aplique en el saco la cantidad exacta.
- ✓ Parpadee un par de veces para extender las gotas por toda la superficie ocular
- ✓ Cierre el ojo durante unos dos minutos. No lo cierre demasiado fuerte
- ✓ Recuerde espaciar al menos 5-10 minutos la administración de algún otro colirio.

VER IMAGEN A CONTINUACIÓN



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si se **olvida una dosis** póngala si no ha pasado mucho tiempo, si no se debe continuar con el tratamiento normal al día siguiente. **NO SE PONGA NUNCA UNA DOSIS DOBLE** para compensar la que olvidó.

No debe instilarse más de una gota en el (los) ojo(s) afectados.

Contraindicaciones

No utilice el colirio de losartan en caso de hipersensibilidad a ésta o a alguno de sus excipientes (el disolvente es suero fisiológico)

Embarazo y lactancia:

No se espera mucha absorción sistémica; no obstante, en caso de embarazo hable con su médico para valorar el beneficio/riesgo

Interacciones con otros medicamentos:

Puede que le indiquen tratamiento conjunto con lágrimas artificiales o con algún otro colirio. Se recomienda esperar unos 10 minutos entre la administración de uno y otro. Si además se pone una pomada oftálmica póngase primero el colirio y a los 10 minutos la pomada.

Reacciones adversas:

En general se tolera muy bien. Hasta ahora todos los pacientes lo han tolerado muy bien, aunque la experiencia es todavía escasa.

No se espera que afecte a los niveles de tensión arterial

Informe a su médico ante la aparición de cualquier síntoma que pudiera experimentar