



**Dasatinib** es un antineoplásico inhibidor de la quinasa BCR ABL, que inhibe la proliferación e induce la muerte de las células que expresen esta proteína. Se utiliza como tratamiento de la leucemia mieloide crónica (LMC) cromosoma Filadelfia positivo (Ph+) y leucemia linfocítica aguda (LLA) Ph+ también.

### Objetivos del tratamiento

Se pretende obtener la respuesta molecular profunda o completa ( $BCR::ABL \leq 0,01\%$ ) Aunque inicialmente se trataba de tratamientos crónicos, actualmente en pacientes que cumplan determinados criterios clínicos y hematológicos se puede plantear la interrupción del fármaco, pero siempre lo debe decidir su médico. Recuerde que es fundamental para alcanzar una buena respuesta una adecuada adherencia, o sea intentar que no se olvide ninguna o casi ninguna dosis **y no interrumpir el tratamiento** sin que se lo diga su médico.

### Posología y forma de administración

La dosis inicial varía en función de la indicación

- En LMC en fase crónica es de 100 mg una vez al día
- En LLA o en LMC en forma acelerada o crisis blástica es de 140 mg al día

Pero su médico le puede ajustar la dosis en función de los resultados de la analítica o de la respuesta clínica. Atégase siempre a lo que le indiquen.

Se pueden tomar con o sin comida (con comida se toleran mejor en caso de intolerancia gástrica) pero siempre intentado que sea a la misma hora del día aproximadamente.

Deben tragarse enteros con un vaso de agua, sin masticar ni chupar. Si tiene problemas para tragar puede disolverlo en algo de agua o zumo y consultar como hacerlo.

Evite el contacto con la piel: lávese las manos antes y después de manipularlos.

Debe evitar el pomelo o zumo de pomelo, y si toma antiácidos (Almax, Rennie, Bemolan,...), debe espaciarlo al menos tres horas de la toma del medicamento.

### Qué hacer si...

- si se ha olvidado tomar una dosis: tómela lo antes posible. Si han pasado más de 6 horas, espere a la siguiente toma y no doble nunca la dosis.
- si vomita, únicamente repita la dosis si ha transcurrido menos de 1 hora desde la toma
- En caso de duda, coméntelo con su médico o farmacéutico.

### Contraindicaciones

- Si usted es alérgico a dasatinib o a cualquiera de los excipientes
- Si está embarazada o en período de lactancia

Más información en <https://aelemic.org/>  
<https://www.sefh.es/escuela-de-pacientes-enfermedad-detalle.php?id=11>

### Precauciones

- Si padece alguna enfermedad pulmonar (neumonitis) o del ritmo cardiaco
- Debe asegurarse que no es portador del virus de la hepatitis B
- Protéjase del sol
- Mantenga una buena higiene de manos
- Adopte 2 medidas anticonceptivas si usted o su pareja puede quedarse embarazad. Manténgalas hasta 2 semanas después de haber finalizado el tratamiento
- Se recomienda usar gel de baño sin detergente y champús suaves y si se reseca la piel cremas hidratantes.
- Consulte con su médico o farmacéutico antes de vacunarse

### Efectos adversos

Aunque a continuación enumeremos muchos, hay que decir que todas las personas lo padecen y que con frecuencia aparecen al principio y desaparecen conforme avanza el tratamiento. En cualquier caso ante la aparición de algún síntoma no dude en consultar.

Los más frecuentes son:

- Diarrea, náuseas, vómitos o dolor abdominal
- Cansancio, falta de aire, dolor muscular o dolor de cabeza
- Retención de líquidos en general y aparición de edemas (párpados, tobillos). Si aparece intente restringir la sal de la dieta.
- Erupciones cutáneas
- Disminución de células sanguíneas (anemia, plaquetopenia,...)

También se han descrito, con menos frecuencia, aparición de infecciones, sequedad de piel y ojos, alteraciones del ritmo cardiaco, llagas en la boca, problemas de sueño,...

**AVISE A SU MÉDICO RÁPIDAMENTE SI TIENE:** una reacción alérgica grave; signos de infección como tos, escalofríos, dificultad al orinar o fiebre; signos de sangrado (heces negras, sangre en la orina, hematomas importantes); convulsiones; confusión; alucinaciones; signos cardíacos graves y en caso de sobredosis.

### Interacciones

**Pregunte a farmacéutico o médico** siempre antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal, especialmente si toma: antifúngicos (itraconazol, voriconazol); antibióticos (claritromicina, rifampicina, telitromicina); algunos antivirales; ciertos antiepilépticos (fenobarbital, carbamazepina, fenitoína); anticoagulantes (warfarina, acenocumarol); dexametasona, simvastatina o hipérico.

Fármacos

Podría ser que alguno de los medicamentos tuviera menos efectos o que aparezcan efectos secundarios no deseados.