

SABÍA
QUE...

Delafloxacin es un antibiótico del grupo de las quinolonas con un espectro bacteriano más amplio. Inhibe de una forma similar la topoisomerasa IV y la ADN girasa (topoisomerasa II), lo que hace que sea activo tanto frente a bacteria Gram+ como a bacterias Gram-

Posología

Se administra por vía oral, con o sin alimentos, y habitualmente cada 12 h

Es **MUY IMPORTANTE** que el intervalo sea de 12 horas justas

Los comprimidos deben tragarse enteros con un vaso de agua sin masticar ni chupar en la boca ni disolverlos

¿Qué hacer si ha olvidado una dosis?

Si aún **NO han pasado 6 horas**, tome la dosis olvidada lo antes posible y continúe el tratamiento con el horario habitual

Si han pasado **más de 6 horas** desde el olvido, no tome la dosis olvidada y espere a la próxima toma

NUNCA tome una dosis doble para compensar un olvido

No tome delafloxacin si:

Es alérgico al fármaco, a alguno de sus excipientes o a cualquier antibiótico del grupo de las quinolonas

Está embarazada o en periodo de lactancia

Tiene antecedentes previos de problemas en el tendón relacionados con la administración de fluoroquinolonas

Delafloxacin está contraindicado en **menores de 18 años**

Precaución si padece

Problemas de articulaciones

Insuficiencia renal

Problemas neurológicos, incluido epilepsia, ya que puede disminuir el umbral de aparición de convulsiones

Miastenia gravis

Diseción aórtica, aneurisma o problemas con las válvulas cardíacas

Efectos adversos

Los efectos adversos más frecuentes, que no significa que aparezcan siempre, son:

- Dolor de cabeza
- Picor
- Molestias gastrointestinales: diarrea, náuseas
- Alteraciones de los niveles de glucemia. Controle sus niveles con más frecuencia en caso de diabetes

Póngase en contacto con su médico si nota:

- Síntomas de reacciones alérgicas (dificultad para respirar, hinchazón de cara, erupción generalizada,...)
- Hormigueo o dolor de extremidades que no remite
- Signos de rotura del tendón: dolor repentino, hinchazón, hematoma, rigidez,..
- Cualquier otro efecto adverso grave

Interacciones

DELAFLOXACINO tiene interacciones con algunos medicamentos, que puede hacer que no haga el efecto deseado o que aparezcan reacciones adversas no deseadas. A modo de ejemplo:

- Con antiácidos que tengan sales de magnesio o aluminio (Almax, Rennie, Gaviscon,...) debe espaciar la toma 2-4 horas al menos.
- Precaución con otros fármacos que puedan alargar el intervalo QT
- Fármacos para el colesterol como bempedoico
- Precaución también cuando se administra conjuntamente con otros fármacos que puedan provocar roturas del tendón como corticoides
- Otros fármacos como micofenolato o tramadol
- Espaciar también 3-4 horas la toma de multivitamínicos

En cualquier caso no olvide consultar a su farmacéutico o médico si le recetan algún tratamiento o preparado nuevo