

SABÍA
QUE...

Sobre su enfermedad

El fármaco es una combinación de dos principios activos, dextrometorfano y quinidina, y se usa para tratar la labilidad emocional (PBA por sus siglas en inglés). Se trata de una afección que presenta ataques repentinos de llanto o risa incontrolables en personas con determinadas enfermedades como Esclerosis Múltiple y Esclerosis Lateral Amiotrófica.

Sobre su medicación

Datos de administración

Siga exactamente las instrucciones de administración de dextrometorfano-quinidina indicadas por su médico.

La dosis recomendada es de una cápsula una vez al día una semana y después dos veces al día (cada 12 horas), intentando dejar 12 horas exactas entre cada dosis. No tome más de 2 dosis en un período de 24 horas.

Los alimentos no afectan a su absorción: da igual tomarlo con comida que con el estómago vacío.

Debe evitar el zumo de pomelo o naranja amarga

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

En caso de que olvide una dosis, deje pasar la dosis que olvidó y tome la próxima dosis en el horario normal.

NUNCA tome una dosis doble para compensar el olvido

No tome DEXTROMETORFANO-QUINIDINA si...

- Es alérgico a dextrometorfano, quinidina o cualquiera de los demás componentes
- Tiene antecedentes compatibles con taquicardia ventricular
- Tiene bloqueo auriculoventricular completo sin marcapasos implantado

Embarazo y lactancia

Mujeres en edad fértil deben usar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento. Si quedara embarazada, informe a su médico. No se debe dar el pecho durante el tratamiento

Precauciones

Los pacientes con problemas respiratorios como enfisema, bronquitis crónica, asma, o si la tos se acompaña de secreciones excesivas, deben consultar antes de iniciarlo

En pacientes con dermatitis atópica

En insuficiencia hepática o renal grave

Efectos adversos

Las más frecuentes, que no quiere decir que le ocurran a todo el mundo son:

- Diarrea, náuseas, gases
- Mareo, dolor de cabeza, somnolencia
- Cansancio o tos

Informe a su médico si notase pulsaciones lentas, rápidas o irregulares, signos de reacción alérgica (dificultad para respirar, hinchazón de cara, erupción generalizada,...), espasmos musculares o cualquier otra reacción grave

Toma con otros medicamentos

Este fármaco tiene bastante interacciones con otros, que puede provocar que tenga menos efecto o que aparezcan efectos adversos no deseados. A modo de ejemplo:

- Fármacos que puedan provocar síndrome serotoninérgico como algunos antidepresivos, algún componente de antigripales, antimigrañosos, linezolid,...
- Medicamentos que puedan alterar el ritmo cardiaco (período QT)
- Otros como haloperidol, cinacalcet, algunos antifúngicos, algunos opiáceos, rifampicina, antibióticos macrólidos, etcétera

Avisé a su farmacéutico o médico si le recetan algún medicamento, planta medicinal o producto dietético nuevo, para descartar que tenga alguna interacción