

SABÍA
QUE...

Mitapivat es una molécula que activa una enzima llamada piruvato quinasa R (PVKR). Esta enzima tiene un importante papel en el mantenimiento de los glóbulos rojos, y su déficit provoca un tipo de anemia llamada hemolítica (que es cuando los glóbulos rojos se destruyen más rápido que se forman). Está indicado en España para adultos que tienen déficit de dicha enzima. Se trata de una enfermedad congénita debido a mutaciones del gen PKLR.

Mitapivat no cura la enfermedad. El **objetivo del tratamiento** es mantener una cifra de glóbulos rojos adecuada.

Posología y forma de administración

- La dosis de inicio es de 5 mg dos veces al día
- Según la respuesta clínica (niveles de hemoglobina y necesidad de transfusiones) se irá ajustando la dosis cada 4 semanas hasta 20 mg dos veces al día o 50 mg dos veces al día que es la dosis máxima.
- Si aparecieran efectos adversos podrían disminuirle la dosis, pero **NUNCA** abandone el tratamiento por su cuenta, ya que es extremadamente importante hacerlo de forma gradual. En caso contrario puede dar lugar a una hemólisis aguda grave. A grandes rasgos, se toma durante una semana una sola vez al día y durante la semana siguiente una dosis más baja también una sola vez al día. En cualquier caso atégase siempre a la pauta que le indique su médico.

Los comprimidos deben tomarse enteros, sin triturar ni partir. Se pueden tomar junto con las comidas o con el estómago vacío, pero a la misma hora del día en la medida de lo posible. Debe sacar los comprimidos de su blíster justo antes de tomarlos, no con antelación

Evite el pomelo y el zumo de pomelo

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

- Si olvida tomar una dosis hágalo lo antes posible, pero si ya han pasado más de cuatro horas espere a la siguiente toma. No **DOBLE una DOSIS** para compensar olvidos.
- Si vomita, únicamente repita la dosis si ha transcurrido menos de 1 h desde la toma.
- En cualquier caso es importante que intente no saltarse ninguna dosis y que acuda a sus revisiones con la periodicidad que le indiquen

No usar Pyrukynd®:

- * En caso de alergia a mitapivat o a alguno de los componentes.
- * Insuficiencia hepática grave
- * En caso de embarazo (se ha demostrado efectos en el feto en animales) y lactancia.

Precauciones

En caso de embarazo debe usar dos métodos anticonceptivos eficaces, ya que mitapivat puede reducir la eficacia de los anticonceptivos orales

Controle su tensión sobre todo al principio del tratamiento

Efectos adversos:

Los más frecuentes, que no quiere decir que aparezca en todos los pacientes, son:

- ✓ Disminución de la estrona y aumento a la testosterona en hombres
- ✓ Náuseas y molestias de garganta sobre todo al inicio
- ✓ Puede ver aumentado los niveles de triglicéridos en sangre
- ✓ A veces puede aumentar su tensión arterial
- ✓ Puede producir dolores de hueso

Avisé rápidamente a su médico si notase:

- Signos de reacción alérgica (problemas para respirar, hinchazón de cara, erupción generalizada)
- Sobre todo en caso de bajada de dosis si notase color amarillento en la piel o en los ojos u orina de color parduzco

Interacciones:

Mitapivat tiene interacciones con muchos medicamentos. con lo que puede que tenga menos eficacia o aparezcan más efectos adversos. A modo de ejemplo anticonceptivos hormonales, antifúngicos (para infecciones por hongos), ciertos antibióticos, algunos antiepilépticos, algunos analgésicos, inmunosupresores, anticoagulantes orales, colchicina, digoxina, ciertos fármacos oncológicos, hierba de san Juan, etcétera

Es MUY IMPORTANTE que consulte siempre con su farmacéutico o su médico ante cualquier fármaco o producto de herboristería que le prescriban o que vaya a tomarse