

¿Qué es y para qué se utiliza ?

Estos medicamentos se emplean como tratamiento para la hepatitis C, que es una infección del hígado ocasionada por un virus.

MAVIRET® es una combinación de dos principios activos (glecaprevir y pibrentasvir) que actúan inhibiendo la replicación del virus y la formación de nuevos viriones por distinto mecanismo de acción.

Posibles efectos adversos

En general se tolera muy bien (nada que ver con los antiguos tratamientos); no obstante podría aparecer:

- Dolor de cabeza
- Cansancio y debilidad
- Molestias intestinales

Interacciones:

Maviret® interacciona con muchos medicamentos. No debe tomar Maviret si toma atazanavir (VIH), atorvastatina o simvastatina (colesterol), carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, primidona (epilepsia), anticonceptivos orales que contengan etinilestradiol, rifampicina (antibiótico), dabigatrán (anticoagulante) e hierba de San Juan (hipérico).

Además presenta interacciones con inmunosupresores (ciclosporina, tacrolimus), digoxina, ritonavir, lopinavir, efavirenz o darunavir. Si toma omeprazol deberá hacerlo a una dosis máxima de 20 mg y 10-15 minutos después del Maviret. No presenta interacciones con otros inhibidores de la bomba de protones

Debe consultar a su médico o farmacéutico antes de tomar cualquier otro medicamento, incluidos los que no necesiten receta, productos de herboristería, suplementos dietéticos y plantas medicinales.

Contiene lactosa

No utilizar después de la fecha escrita en el envase.

Conserva en un lugar fresco y protegido de la luz y humedad

Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Devuelva la medicación sobrante a la Farmacia del Hospital.

	AL LEVANTARSE		DESAYUNO		COMIDA			MERIENDA		CENA		ANTES DE ACOSTARSE		
	8	9	10	11-12-13	14	15	16	17	18	19-20	21	22	23	24
		3-6												

· Maviret® ·

Se presenta en forma de sobres, con un granulado en su interior de color rosa y amarillo correspondiente a los dos fármacos que lo componen. La dosis dependerá:

- En caso de niños el número de sobres irá en función del peso
- En caso de adultos con problemas de deglución la dosis será de 6 sobres diarios

En ambos casos se hará en una sola toma diaria y junto a alimentos, intentando que sea a la misma hora del día aproximadamente

Modo de hacerlo: El número total de gránulos debe espolvorearse en una sustancia que sea lo suficientemente **espesa** como para cogerla con una cuchara y no se derrame.

Por ejemplo mermelada espesa, yogur griego, crema de cacao, queso de untar, etcétera. No deben utilizarse sustancias muy líquidas ya que los gránulos podrían **disolverse antes de tiempo** y no hacer tanto efecto. Y una vez hecha la mezcla debe administrarse **inmediatamente**, sin dejar pasar tiempo.

La duración del tratamiento dependerá de factores como el genotipo y el grado de afectación. Aténgase siempre a lo que le indiquen y termine siempre el tratamiento

¿Qué hacer si se ha olvidado una dosis?

En caso de que olvide una dosis, tómela lo antes posible, excepto si pasan 18 horas desde la última dosis, en ese caso espere a la siguiente toma.

No tome una dosis doble para compensar la olvidada.

¿Qué hacer si vomita?

Si usted vomita en un plazo de 3 horas después de la administración de este medicamento, debe tomar una dosis adicional. Si han pasado más de 2 horas, no es necesario tomar ninguna dosis adicional.

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.