

SABÍA QUE

Momelotinib (Omjjara®) es un inhibidor de dos enzimas llamadas janus quinasas, fundamentalmente JAK1 y JAK2, implicadas en la proliferación y desarrollo de células sanguíneas y también de la función inmune. Está indicado en mielofibrosis primaria y en mielofibrosis secundaria a policitemia vera o a trombocitemia esencial. Para pacientes que no hayan sido tratados con otros JAK salvo ruxolitinib.

La forma de presentación puede ser muy distinta de un paciente a otro, incluso pacientes sin síntomas, pero lo más frecuente es anemia y esplenomegalia (aumento del tamaño del bazo). La única cura es el trasplante alogénico, pero conlleva riesgos.

El **objetivo** del tratamiento farmacológico es controlar los síntomas: mejorar la anemia (se usa también EPO) y reducir el tamaño del bazo.

Posología y forma de administración

La dosis habitual es de 200 mg una vez al día, pero se la pueden ajustar según analítica. Atégase siempre a lo que le diga su médico

En cuanto a las comidas e puede tomar con o sin alimentos, pero intentando que sea siempre a la misma hora del día y enteras, sin triturar ni partir.

- Evite el contacto con la piel: lávese las manos antes y después de cada toma.

Qué hacer si...

- Si olvidó tomar una dosis de momelotinib, tómela tan pronto se dé cuenta. Si está más cerca de la dosis siguiente, salte la dosis olvidada y tómela según la pauta establecida. NUNCA tome una dosis doble para compensar olvidos.

- Si se producen vómitos durante el curso del tratamiento, no debe tomar una segunda dosis. Simplemente espere a la siguiente toma

No tome Omjjara® si

Si usted es alérgico a momelotinib o a cualquiera de los excipientes.

Si está embarazada o en período de lactancia

No debe iniciar el tratamiento en caso de estar padeciendo una infección grave

Precauciones

- En caso de enfermedad renal o hepática grave
- Si tiene riesgo cardiovascular
- En caso de padecer infecciones de algún tipo con frecuencia
- Debe descartar previamente una hepatitis B o una tuberculosis latente
- Si fuma o ha fumado durante un largo período de tiempo en su vida
- Consulte con su médico o farmacéutico antes de vacunarse
- Es muy importante que acuda a las revisiones analíticas que le indiquen

Efectos adversos

Estos son los efectos adversos que aparecen con más frecuencia, aunque no quiere decir que aparezcan en todos los pacientes.

Los más frecuentes son:

- Dolor de cabeza, mareos o cansancio
- Molestias intestinales: náuseas, diarreas
- Hormigueo en extremidades
- Puede provocar hipotensión: intente tener un aporte de líquidos adecuado y téngalo en cuenta si está en tratamiento para la hipertensión
- Infecciones sobre todo respiratorias, urinarias, aunque también pueden aparecer en otras localizaciones
- Mayor riesgo de hemorragias: Intente evitar golpes, usar cepillos de dientes blandos,...
- A veces puede aparecer tos o visión borrosa

AVISE A SU MÉDICO RÁPIDAMENTE SI TIENE: una reacción alérgica grave; dificultad para respirar o tragar; hinchazón de la cara, labios, lengua o garganta, picor grave de la piel, con una erupción de color rojo o protuberancias, una infección grave o una hemorragia importante; y en caso de sobredosis.

Interacciones

Momelotinib presenta interacciones con muchos medicamentos que hace que pueda afectar su eficacia o aparecer efectos adversos. A modo de ejemplo:

- ✓ Otros medicamentos que puedan provocar trombos
- ✓ Antifúngicos (voriconazol, itraconazol, posaconazol,...)
- ✓ Antibióticos como claritromicina, rifampicina o rifabutina)
- ✓ Antiepilépticos (fenobarbital, carbamazepina, fenitoína)
- ✓ Fármacos que pueden afectar al sistema inmune
- ✓ Otros como ciclosporina, tizanidina, gemfibrozilo o rosuvastatina (otras estatinas no)
- ✓ Plantas medicinales como la hierba de san Juan o hipérico
- ✓ Con otros medicamentos oncológicos, con varios antivirales, etcétera

Es muy importante que pregunte a su farmacéutico o a su médico antes de tomar un nuevo medicamento, vitamina o planta medicinal