

En general el mayor riesgo de infección ocurre con los **procedimientos dentales que requieren manipulación de la encía, o de la zona periapical dental, o apertura de la mucosa**. En cambio no son necesarios en otros procedimientos, como endoscopias o cirugía mayor o menor.

En determinados casos **su médico puede considerar utilizar profilaxis antibiótica individualizada** ante una situación que implique un mayor riesgo, en estos casos lo importante es la dosis única previa al procedimiento.

En caso de tener fiebre sin otros síntomas debe consultar con su médico y no debe tomar antibióticos sin prescripción médica. Cuando padezca alguna infección **debe completar el tiempo de tratamiento** que le indique su médico.

Para mayor información

- Circulation Patient page: http://www.heart.org/idc/groups/heart-public/@wcm/@hcm/documents/downloadable/ucm_480788.pdf
- JAMA Patient page: [http://blueapplecare.com/pdf/Spanish/Endocarditis\(spanish\).pdf](http://blueapplecare.com/pdf/Spanish/Endocarditis(spanish).pdf)



Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD

PROFILAXIS DE ENDOCARDITIS INFECCIOSA. Recomendaciones a pacientes.

Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas,
Microbiología y Medicina Preventiva
y Área del Corazón

Hospital Universitario
Virgen Macarena

La endocarditis infecciosa es una **infección de las válvulas cardiacas** naturales o protésicas y aunque es poco frecuente, puede ser grave en algunos casos, por lo que **es importante prevenirla**. Puede producirse cuando hay paso de microorganismos (gérmenes) a la sangre durante una infección de otro lugar diferente al corazón o cuando se realizan determinadas pruebas diagnósticas o tratamientos como intervenciones dentales. Habitualmente no se afectan las válvulas cardiacas pero existen **circunstancias que los expertos consideran de mayor riesgo** como:



Ser portador de válvulas protésicas (incluidas las implantadas percutáneamente-TAVI) u otro material protésico utilizado en reparaciones valvulares como anuloplastias).



Haber tenido anteriormente una endocarditis infecciosa.



Ser portador de una **cardiopatía congénita** cianótico o corregida o bien cardiopatías congénitas intervenidas anteriormente con defectos residuales. Así mismo en los 6 meses posteriores a la corrección con material protésico.



Trasplante cardiaco con lesiones valvulares.

No existe ningún procedimiento que evite completamente el desarrollo de la infección. **En general se aconseja que se mantenga una adecuada higiene oral**, manteniendo su dentadura en buen estado y visitando al dentista regularmente. **No se aconseja el uso de “piercings” y tatuajes**. Aunque continua siendo un tema polémico, actualmente los expertos recomiendan prevenir estas infecciones con **antibióticos solo en determinados casos** siguiendo la pauta que se indica en la siguiente tabla.

Procedimientos	Pauta	Observaciones
Dentales	Amoxicilina 2 gramos orales En pacientes alérgicos a penicilina Clindamicina 600 mg orales Cuando no sea posible la vía oral: ampicilina 2 gramos óclindamicina 600 mg IVó IM	Dosis única, media a una hora antes del procedimiento. No se aconseja la administración intramuscular en pacientes anticoagulados
Genitourinarios (sondaje, citoscopia, biopsia, cirugía, parto vaginal)	No se aconseja	
Digestivos (Sondaje, endoscopia, cirugía)	No se aconseja	
Respiratorios (broncoscopia, cirugía, intubación)	No se aconseja	
Cutáneos (procedimientos quirúrgicos, drenaje de abscesos)	No se aconseja	