

Se permite conducir...



Síndrome Coronario Agudo

- A las 3 semanas del episodio



Cirugía de revascularización coronaria

- Tras 6 semanas libres de síntomas



Marcapasos

- A las 2 semanas del implante



Prótesis valvular

- En los implantes quirúrgicos a las 6 semanas
- En los implante percutáneos al mes




Desfibrilador implantable

- Si es en prevención primaria a las 2 semanas del implante.
- Si es en prevención secundaria, a los 3 meses (sin descargas ni recurrencias).



Insuficiencia Cardíaca

- SIEMPRE y cuando NO presente síntomas en reposo (NYHA IV)
- En ausencia de SINCOPE y con CONTROL de ARRITMIAS




Enfermedad valvular

- SIEMPRE y cuando NO presente síntomas en reposo (NYHA IV)
- En ausencia de SINCOPE



Angina estable

- En ausencia de angina de reposo o a mínimos esfuerzos.




Intervencionismo coronario programado

- A la semana del procedimiento, en ausencia de angina de reposo o a mínimos esfuerzos.



Síncope

- Se exigen 6 meses sin recurrencias



Miocardiópatías

- En la Miocardiopatía Hipertrófica, en ausencia de síncope o presencia de síntomas en reposo (NYHA IV)
- Otras miocardiopatías requieren informes individualizados