

HORAS	8	Desayuno	11-12	Comida	17	Merienda	20	Cena	23	Al acostarse
										
										
Tomar con o sin alimento. Pueden aparecer molestias gastrointestinales, dolor de cabeza o malestar general al principio. Si apareciera cualquier signo de reacción de hipersensibilidad informar inmediatamente al médico y no volver a tomar el fármaco. Se recomienda una toma regular ya que si no se incrementa la posibilidad de la aparición de la alergia.										
										
Doravirina (Pifeltro). Tomar con o sin alimentos junto a abacavir/lamivudina. Al principio puede haber dolor de cabeza, mareos, insomnio o molestias gastrointestinales que suelen remitir con el curso del tratamiento.										

Abacavir/lamivudina tiene interacciones con medicamentos como leflunomida o el fármaco usado en regímenes de adelgazamiento orlistat.
Doravirina tiene interacciones con fármacos como rifampicina, algunos antiepilépticos, dexametasona, ciertos oncológicos, inmunosupresores ... o con plantas como la hierba de san Juan o la echinacea.
Estos son sólo algunos ejemplos; si comienzas a tomar cualquier fármaco, complejo vitamínico, productos de herboristería, drogas recreativas, etcétera, **por favor consúltanos**. Independientemente de su beneficio o no beneficio hay algunas que no afectan a su tratamiento, otras que sí y otras que pueden ver alterado su efecto a causa del tratamiento antirretroviral.

- **SI SE TE OLVIDA ALGUNA TOMA.....**

..... y no han pasado 12 horas, tómatela.

.....y hace más de 12 horas que te la tenías que haber tomado, sigue con tu horario normal pasando a la siguiente toma.

ii NUNCA TE TOMES EL DOBLE EN LA SIGUIENTE PARA COMPENSAR UN OLVIDO!!

- Para que tu tratamiento funcione debes tomarte **O TODAS O NINGUNA** de tus medicinas. No deben abandonarse los tratamientos pero, si por algún motivo se te olvida una de ellas o decides no tomar alguna porque piensas que te está sentando mal, debes dejarlas **todas**.
- **SI VOMITAS LAS PASTILLAS** intenta tomarlas de nuevo. Si ya ha pasado más de 30-40 minutos no lo haga, porque ya se habrá absorbido una cantidad significativa del fármaco. Si ves que no puedes y te sucede con frecuencia explícaselo a tu médico o farmacéutico: existen formas de reducir los vómitos.
- Es muy importante que tome la medicación siempre a la **MISMA HORA**.