


	HORAS	8	Desayuno	11-12	Comida	17	Merienda	20	Cena	23	Al acostarse
ABACAVIR 600mg + LAMIVUDINA 300mg											
											
RALTEGRAVIR (ISENTRES)											
											

Se puede tomar con o sin alimento. Pueden aparecer molestias gastrointestinales, cefalea, malestar general. Si apareciera cualquier signo de reacción de hipersensibilidad informar inmediatamente al médico y no volver a tomar el fármaco. Se recomienda una toma regular ya que si no se incrementa la posibilidad de la aparición de la alergia.

Tome DOS comprimidos enteros juntos una vez al día, con o sin alimentos. Pueden aparecer diarreas, cefalea y náuseas. La administración conjunta con antiácidos o complejos vitamínicos que contengan sales de hierro, magnesio o aluminio puede hacer que no llegue a sangre la cantidad necesaria. Debe espaciar al menos 4 horas la toma de uno y otro. Contiene lactosa.

La combinación abacavir/lamivudina no debe ser administrada junto con análogos de citidina debido a su similitud, como emtricitabina. Si se encuentra en tratamiento con cotrimoxazol, el paciente debe ser vigilado clínicamente. Se desaconseja el uso concomitante de lamivudina junto con cladribina.

Raltegravir, además de las descritas arriba, tiene interacciones con medicamentos como rifampicina, con algunos usados para tratar el colesterol o los triglicéridos o el fármaco usado en regímenes de adelgazamiento orlistat.

Estos son sólo algunos ejemplos; si comienzas a tomar cualquier fármaco, complejo vitamínico, productos de herboristería, drogas recreativas, etcétera, **por favor consúltanos**. Independientemente de su beneficio o no beneficio hay algunas que no afectan a su tratamiento, otras que sí y otras que pueden ver alterado su

LEE ATENTAMENTE ESTOS CONSEJOS

- **SI SE TE OLVIDA ALGUNA TOMA.....**

..... y no han pasado 12 horas, tómatela.

.....y hace más de 12 horas que te la tenías que haber tomado, sigue con tu horario normal pasando a la siguiente toma.

ii NUNCA TE TOMES EL DOBLE EN LA SIGUIENTE PARA COMPENSAR UN OLVIDO!!

- Para que tu tratamiento funcione debes tomarte **O TODAS O NINGUNA** de tus medicinas.
- No deben abandonarse los tratamientos pero, si por algún motivo se te olvida una de ellas o decides no tomar alguna porque piensas que te está sentando mal, debes dejarlas **todas**.
- **SI VOMITAS LAS PASTILLAS** intenta tomarlas de nuevo. Si ya ha pasado más de 30-40 minutos no lo haga, porque ya se habrá absorbido una cantidad significativa del fármaco.
Si ves que no puedes y te sucede con frecuencia explícaselo a tu médico o farmacéutico: existen formas de reducir los vómitos.
- Es muy importante incluir la toma de medicamentos en tu rutina de vida y hacerlo siempre a la **MISMA HORA**.