

SABÍA QUE...

Este colirio contiene **ciclosporina**, un medicamento inmunosupresor que se utiliza en este caso para tratar queratitis graves, inflamación en la córnea (la capa que cubre la parte frontal del ojo) en pacientes con enfermedad del ojo seco que no responde a los tratamientos de primera línea

Las causas son diversas (muchas de carácter infeccioso) y una de ellas es el síndrome del ojo seco, donde el organismo no produce la suficiente cantidad de lágrimas, pudiéndose llegar incluso a la formación de úlceras. Ciclosporina reduce la inflamación y ayuda a la producción de lágrimas

¿Cómo administrarlo?


- Vía oftálmica.

- La dosis recomendada es una gota de colirio ciclosporina **0,1% una vez al día**, a la hora de acostarse, o bien una gota de colirio ciclosporina **0,05% dos veces al día** aplicando una de ellas en el (los) ojo(s) afectados a la hora de acostarse. En cualquier caso atégase a lo que le indique su médico.

Caducidad: 30 días: pero una vez abierto el envase su caducidad será de 15 días

¿Cómo debo aplicarlo?

- ✓ Lávese las manos
- ✓ Incline la cabeza hacia atrás y mire hacia arriba.
- ✓ Tire hacia abajo del párpado inferior para hacer un saco.
- ✓ Aproxime el cuentagotas al saco conjuntival sin tocarlo para evitar contaminarlo.
- ✓ Aplique en el saco la cantidad exacta.
- ✓ Parpadee un par de veces para extender las gotas por toda la superficie ocular
- ✓ Cierre el ojo durante unos dos minutos. No lo cierre demasiado fuerte.



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si se **olvida una dosis** póngala si no ha pasado mucho tiempo, si no se debe continuar con el tratamiento normal al día siguiente. **NO SE PONGA NUNCA UNA DOSIS DOBLE** para compensar la que olvidó.

No debe instilarse más de una gota en el (los) ojo(s) afectados.

NO utilice ciclosporina colirio si ...

- ES USTED ALÉRGICO AL PRODUCTO O ALGUNO DE SUS EXCIPIENTES.

Precauciones:

- 1) Las **lentes de contacto** se deben quitar antes de instilar el colirio a la hora de acostarse y no volvérselas a poner hasta la mañana siguiente. En el caso de la dosis de la mañana debe esperar al menos 15 minutos para colocarse la lentilla.
- 2) Precaución si usted tiene antecedentes de **herpes ocular**.
- 3) Si usted padece de **glaucoma** consulte a su médico antes iniciar el tratamiento con ciclosporina oftálmica.
- 4) Se debe reevaluar la respuesta al tratamiento como mínimo **cada 6 meses**
- 5) **Consulte si está embarazada o en periodo de lactancia**

Interacciones de la ciclosporina con otros medicamentos:

Si está en tratamiento con varios colirios a la vez se recomienda esperar unos 10 minutos entre la administración de uno y otro. Si además se pone una pomada oftálmica póngase primero el colirio y a los 10 minutos la pomada.

Si se administra algún colirio que contenga corticoides consulte a su farmacéutico para evitar posibles efectos adversos, ya que potenciaría la inmunosupresión.

Reacciones adversas:

Las **reacciones adversas más frecuentes**, que no tienen porqué producirse, son dolor en el lugar de la instilación, enrojecimiento, hinchazón del párpado, aumento del lagrimeo o irritación ocular. A veces algún paciente ha referido visión borrosa. Todas son ligeras y transitorias y desaparecen con la interrupción del tratamiento. A veces le pueden prescribir un corticoide los primeros días para paliar la irritación inicial.

Algunos efectos adversos **menos frecuentes** son: edema conjuntival, trastorno lagrimal, secreción ocular, prurito ocular, irritación conjuntival, conjuntivitis, sensación de cuerpo extraño en los ojos, depósito ocular, queratitis, descompensación corneal, infiltrados corneales, cicatriz corneal, prurito palpebral.

Debe tenerse en cuenta que en tratamientos prolongados la inmunosupresión excesiva puede incrementar la susceptibilidad a las infecciones.

Informe a su médico si tiene alguno de los estos síntomas.

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente. NO debe ser utilizado por otras personas, aunque presente sus mismos síntomas, podría perjudicarlo.