

SABÍA QUE...

El **colirio autólogo** es un colirio obtenido como fórmula magistral, y en campana estéril, a partir del suero del propio paciente. Las lágrimas contienen sustancias fundamentales para la integridad de la mucosa ocular, sustancias que se encuentran también en el suero sanguíneo. Así pues el colirio autólogo va a ayudar a regenerar la superficie dañada.

Actúa lubricando y nutriendo el ojo en determinadas afecciones oculares que cursan con úlceras o perforaciones de la mucosa llamadas de forma genérica *defectos epiteliales persistentes* (DEP). Éstos pueden ser debidos a síndrome de ojo seco grave, procesos infecciosos, traumatismos, abrasiones químicas,...


¿Cómo administrarlo?

- Vía oftálmica.

- La dosis puede variar en función del tipo de afección y del momento del tratamiento. En cualquier caso, aténgase a la dosis prescrita por su médico.

¿Cómo debo aplicarlo?

- ✓ Lávese las manos
- ✓ Atempere con las manos el frasco antes de administrárselo, pero no utilice ninguna fuente de calor externa
- ✓ Incline la cabeza hacia atrás y mire hacia arriba.
- ✓ Tire hacia abajo del párpado inferior para hacer un saco.
- ✓ Aproxime el cuentagotas al saco conjuntival sin tocarlo para evitar contaminarlo.
- ✓ Aplique en el saco la cantidad exacta.
- ✓ Parpadee un par de veces para extender las gotas por toda la superficie ocular
- ✓ Cierre el ojo durante unos dos minutos. No lo cierre demasiado fuerte
- ✓ Recuerde espaciar al menos 5-10 minutos la administración de algún otro colirio.



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si se **olvida una dosis** póngala si no ha pasado mucho tiempo, si no se debe continuar con el tratamiento normal al día siguiente. **NO SE PONGA NUNCA UNA DOSIS DOBLE** para compensar la que olvidó.

No debe instilarse más de una gota en el (los) ojo(s) afectados.

Contraindicaciones y precauciones:

- No deben usarse en

- ✓ Procesos infecciosos agudos
- ✓ Tumores en el área de aplicación

- Se debe tener precaución en trastornos oculares relacionados con la vascularización excesiva

Valorar en pacientes con alteraciones de la coagulación

Puede tener visión borrosa recién puesto. Hasta que recupere la agudeza visual no debe conducir ni manejar maquinaria peligrosa.

Evite en lo posible el uso de lentes de contacto durante el tratamiento.

Interacciones con otros medicamentos:

Si está en tratamiento con varios colirios a la vez se recomienda esperar unos 10 minutos entre la administración de uno y otro. Si además se pone una pomada oftálmica póngase primero el colirio y a los 10 minutos la pomada.

Reacciones adversas:

En general son leves y poco frecuentes. Se ha descrito a veces

- ✓ Visión borrosa al principio
- ✓ Fotofobia
- ✓ Irritación, enrojecimiento y picor ocular

Informe a su médico si alguno de los estos síntomas persiste o es demasiado grave o ante la aparición de cualquier otro síntoma distinto a los aquí descritos.

El plazo de validez es de 7 días desde su descongelación y conservada en nevera (4-8°C). Antes de abrirlo debe conservarlo en congelador a menos de -20°C

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente. NO debe ser utilizado por otras personas, aunque presente sus mismos síntomas, podría perjudicarle.