

SABÍA QUE...

El **colirio de insulina** se utiliza para el tratamiento de diversas patologías de la superficie ocular, entre ellas las úlceras corneales. Pacientes con defectos de córnea permanente de distinta etiología (traumática, cáustica, infecciosa y otras) que son refractarios a terapia convencional son candidatos a su uso

La insulina actuaría sobre las células stem del epitelio corneal, activando su proliferación. De esta manera tiene un efecto reepitelizante sobre la superficie de la córnea. Un porcentaje muy alto de los pacientes tratados con colirio de insulina obtuvo recuperación completa, y los que no lo hicieron recobraron un porcentaje importante del área dañada.


¿Cómo administrarlo?

- Vía oftálmica.

- La dosis habitual es de una gota cada 6 horas respetando el sueño, pero puede variar en función del tipo de afección y del momento del tratamiento. En cualquier caso, atégase a la dosis prescrita por su médico.
- El tiempo para alcanzar esta curación es de 1-2 meses. NUNCA debe abandonar el tratamiento antes de tiempo aunque note mejoría.

¿Cómo debo aplicarlo?

- ✓ Lávese las manos
- ✓ Atempere con las manos el frasco antes de administrárselo, pero no utilice ninguna fuente de calor externa
- ✓ Incline la cabeza hacia atrás y mire hacia arriba.
- ✓ Tire hacia abajo del párpado inferior para hacer un saco.
- ✓ Aproxime el cuentagotas al saco conjuntival sin tocarlo para evitar contaminarlo.
- ✓ Aplique en el saco la cantidad exacta.
- ✓ Parpadee un par de veces para extender las gotas por toda la superficie ocular
- ✓ Cierre el ojo durante unos dos minutos. No lo cierre demasiado fuerte
- ✓ Recuerde espaciar al menos 5-10 minutos la administración de algún otro colirio.



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si se **olvida una dosis** póngala si no ha pasado mucho tiempo, si no se debe continuar con el tratamiento normal al día siguiente. **NO SE PONGA NUNCA UNA DOSIS DOBLE** para compensar la que olvidó.

No debe instilarse más de una gota en el (los) ojo(s) afectados.

Contraindicaciones

No utilice el colirio de insulina en caso de hipersensibilidad a ésta o a alguno de sus excipientes.

Precauciones:

El colirio de insulina tiene un olor peculiar, pero es normal

Embarazo y lactancia:

Lo puede usar libremente tanto en embarazo como en lactancia

Interacciones con otros medicamentos:

Puede que le indiquen tratamiento conjunto con lágrimas artificiales o con algún otro colirios. Se recomienda esperar unos 10 minutos entre la administración de uno y otro. Si además se pone una pomada oftálmica póngase primero el colirio y a los 10 minutos la pomada.

Reacciones adversas:

En general se tolera muy bien. No obstante hay algún paciente que ha referido, sobre todo al principio, cierta irritación. En cualquier caso fue un efecto adverso leve, con lo que se considera una alternativa bastante segura.

No se espera que afecte a los niveles de glucosa en sangre

Informe a su médico ante la aparición de cualquier otro síntoma distinto a los aquí descritos.

Debe ser conservado en nevera (2-8°C) y desechar a los 7 días una vez abierto

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente. NO debe ser utilizado por otras personas, aunque presente sus mismos síntomas, podría perjudicarle.