

SABÍA QUE...

La **Mitomicina** es un antibiótico antineoplásico que inhibe selectivamente la síntesis de DNA. Por vía tópica oftálmica se utiliza para el tratamiento de algunas afecciones del ojo, tales como las neoplasias malignas conjuntivales

Tiene también otras indicaciones como en el postoperatorio de la cirugía de pterigión o en caso de glaucoma refractario

¿Cómo administrarlo?


- Vía oftálmica.

- La dosis puede variar, aunque generalmente es de 3-4 aplicaciones al día y puede que le indiquen más de un ciclo con períodos de descanso. En cualquier caso, atégase a la dosis prescrita por su médico y no abandone precozmente el tratamiento.

¿Cómo debo aplicarlo?

- ✓ Lávese las manos
- ✓ Incline la cabeza hacia atrás y mire hacia arriba.
- ✓ Tire hacia abajo del párpado inferior para hacer un saco.
- ✓ Aproxime el cuentagotas al saco conjuntival sin tocarlo para evitar contaminarlo.
- ✓ Aplique en el saco la cantidad exacta.
- ✓ Parpadee un par de veces para extender las gotas por toda la superficie ocular
- ✓ Cierre el ojo durante unos dos minutos. No lo cierre demasiado fuerte
- ✓ Recuerde espaciar al menos 5-10 minutos la administración de algún otro colirio.

¡¡ ES IMPORTANTE MANIPULARLO CON GUANTES!!



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si se **olvida una dosis** póngala si no ha pasado mucho tiempo, si no se debe continuar con el tratamiento normal al día siguiente. **NO SE PONGA NUNCA UNA DOSIS DOBLE** para compensar la que olvidó.

No debe instilarse más de una gota en el (los) ojo(s) afectados.

NO utilice mitomicina colirio si ...

- ES USTED ALÉRGICO AL PRODUCTO O ALGUNO DE SUS EXCIPIENTES.

Precauciones:

- 1) Evite el uso de **lentes de contacto** durante el tratamiento
- 2) Puede tener **visión borrosa** recién puesto. Hasta que recupere la agudeza visual no debe conducir ni manejar maquinaria peligrosa.
- 3) Consulte si está **embarazada** o en **período de lactancia**

Interacciones de la ciclosporina con otros medicamentos:

Si está en tratamiento con varios colirios a la vez se recomienda esperar unos 10 minutos entre la administración de uno y otro. Si además se pone una pomada oftálmica póngase primero el colirio y a los 10 minutos la pomada.

Reacciones adversas:

En pacientes especialmente sensibles a mitomicina aplicada tópicamente, pueden aparecer reacciones tales como: irritación, ardor, lagrimeo, sensación de cuerpo extraño etc. Todas son ligeras y transitorias y desaparecen con la interrupción del tratamiento.

Informe a su médico ante cualquier otro síntoma que aparezca cuando inicie el tratamiento

Se trata de un medicamento **citostático**. Si se derrama sobre cualquier superficie lávela con abundante agua y jabón
Devuelva al servicio de Farmacia los frascos con restos no utilizados
Manipule siempre el producto con guantes



Guardar en frigorífico y recuerde que una vez abierto debe desecharlo en 7 días

Y devolver los envases usados al servicio de Farmacia

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente. NO debe ser utilizado por otras personas, aunque presente sus mismos síntomas, podría perjudicarlo.