

SABÍA QUE...

Voriconazol es un antifúngico (sirve para tratar infecciones producidas por hongos) azólico de amplio espectro, que inhibe la síntesis de la membrana celular de los hongos. A usted se lo han prescrito para el tratamiento de una infección ocular llamada queratitis fúngica. Hay experiencia también en tratamientos de Acanthamoeba resistente a clorhexidina


Posología

La dosis puede variar en función del tipo de infección y el momento de su tratamiento. Generalmente se empieza con pautas cada hora o cada 2 horas y después se van espaciando. En cualquier caso atégase a lo que le prescriba el médico y nunca abandone el tratamiento aunque note mejoría.

Avisé a su médico si no nota mejoría en los 2-3 primeros días

¿Cómo administrarlo?

- Lávese bien las manos y atempere el colirio con las manos. Sin utilizar ninguna fuente externa de calor
- Incline la cabeza hacia atrás y mire arriba.
- Tire hacia abajo del párpado inferior para hacer un saco.
- Aproxime el cuentagotas al saco conjuntival **sin tocarlo** para evitar contaminarlo.
- Aplique en el saco la cantidad exacta.
- Parpadee un par de veces para extender las gotas por toda la superficie
- Cierre el ojo durante uno o dos minutos. No lo cierre demasiado fuerte.



¿Qué hacer si se me olvida una dosis?

Póngasela tan pronto como sea posible, pero si ya está cerca de la siguiente toma espere a ésta. No se administre una dosis doble para compensar las olvidadas.

No usar si:

Si tiene alergias a voriconazol o a alguno de sus excipientes.

Precaución en:

En general se tolera bien, pero puede causar, sobre todo al principio, visión borrosa. Tenga precaución si tiene que conducir o manejar maquinaria peligrosa.

No utilizar **lentes de contacto** durante el tratamiento.

No debe haber problema, pero si está o puede estar embarazada o si está en periodo de lactancia, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

Efectos adversos

En general se tolera bien y son transitorios. Los más frecuentes son los siguientes:

- Escoror o quemazón en el ojo
- Visión borrosa
- Lagrimeo

Interacciones

- ❖ Si está en tratamiento con varios colirios a la vez se recomienda esperar unos 5 minutos entre la administración de uno y otro.
- ❖ Si además se pusiera una pomada oftálmica póngase primero el colirio y a los 10 minutos la pomada.

Conservar en lugar seco. Una vez abierto tiene una validez de 7 días en nevera
Deseche el frasco si observa un color amarillento o presencia de partículas