

SABÍA  
QUE...

**Eurartesim®** contiene los componentes piperquina tetrafosfato y dihidroartemisinina, activos ambos para combatir el desarrollo de la malaria. Actúan frente al parásito *Plasmodium falciparum*, causante de la enfermedad al transmitirse por la picadura de mosquitos infectados.



## Cómo debo tomarlo



Es importante tomarlo con el estómago vacío (tres horas antes o después de la ingesta de alimentos. Tragar solo con agua. Son sólo tres dosis (tres días) que deben ser tomadas a la misma hora.

En cuanto a la dosis es distinta según el paciente. Aténgase a lo que le indique su médico, pero en general y en personas adultas las dosis son:

- 36-75 Kg tres comprimidos de 320/40mg/día
- 75-100Kg cuatro comprimidos de 320/40mg/día

Evite el zumo de pomelo mientras esté tomando este medicamento

## ¿Qué hacer si se me olvida una dosis?

Tómela tan pronto sea posible, pero si ya está cerca de la siguiente toma espere a ésta. **No tome nunca dosis doble** para compensar olvidos.

## Precauciones

No se pueden administrar más de dos ciclos de Eurartesim en un periodo de 12 meses y tampoco se debe administrar un segundo ciclo de Eurartesim en los dos meses siguientes al primer ciclo debido a la larga semivida de eliminación de piperquina .

## No usar si:

Si tiene alergias al principio activo, a alguno de sus excipientes

Si tiene problemas de corazón o algún familiar directo falleció repentinamente por ello

Si padece desequilibrios hidroelectrolíticos (niveles alterados de sales en el organismo)

Si recibió en el último mes profilaxis o tratamiento para la malaria con ciertos medicamentos: mefloquina, halofantrina, lumefantrina, cloroquina o quinina.

**Embarazo y lactancia.** No debe tomarlo si está en el primer trimestre de embarazo y debe extremar las medidas en el mes siguiente al tratamiento (avise siempre a su médico si queda embarazada y estuvo en tratamiento con Eurartesim el mes previo). No se recomienda tampoco dar el pecho mientras se está en tratamiento.

## Efectos adversos

Aunque el tratamiento es corto pueden aparecer efectos adversos como

- ✓ Dolor de cabeza
- ✓ Palpitaciones
- ✓ Fiebre y debilidad general
- ✓ Tos en niños

Si notase algún efecto adverso grave (palidez excesiva, orina de color parduzco, dificultad para respirar, confusión,...) póngase en contacto con su médico

## Interacciones

Puede tener interacciones con otros medicamentos que haga que pierda efectividad. A modo de ejemplo:

- Benzodiazepinas como midazolam
- Protectores de estómago como omeprazol
- Algunos anestésicos
- Antibióticos como claritromicina o rifampicina
- Algunos antiepilépticos
- Otros medicamentos como nefazodona, verapamilo o teofilina
- Plantas medicinales como la hierba de san Juan
- Medicamentos que puedan alargar el período QT

**No olvide consultar a su farmacéutico o médico si le recetan algún tratamiento nuevo, planta medicinal, etcétera. Debido a su vida media muy larga puede afectar incluso tres meses después**