

SABÍAS
QUE...

Fampridina actúa bloqueando los canales de potasio, reduciendo la fuga de corriente iónica a través de estos canales y prolongando la repolarización. Esto hace que mejore la marcha en algunos pacientes con esclerosis múltiple y discapacidad para ello.



Cómo debo tomarlo



La dosis recomendada es un comprimido de 10 mg dos veces al día, cada 12 horas (un comprimido por la mañana y un comprimido por la noche). No se debe administrar con mayor frecuencia ni a dosis mayores de las recomendadas. Se debe tomar sin alimentos (una hora antes o dos horas después de las comidas) para evitar posibles efectos adversos.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si aun **NO han pasado 6 horas**: tome la dosis olvidada lo antes posible y continúe el tratamiento con el horario habitual.

Si han pasado **más de 6 horas** desde el olvido: No tome la dosis olvidada y espere a la próxima toma.

NUNCA tome una dosis **doble** para compensar un olvido.

No use Fampyra si : Si es alérgico al principio activo o a alguno de los componentes de la formulación.

En pacientes con historia previa o presentación actual de crisis epilépticas y en pacientes con insuficiencia renal leve, moderada o severa (aclaramiento de creatinina < 80 ml/min).

No se debe administrar este fármaco durante **el embarazo** (categoría X).

Se desconoce si la fampridina se excreta en la leche materna por lo que no se recomienda utilizar este fármaco durante la lactancia.

Precaución si:

Tiene problemas de ritmo cardiaco.

Y precaución al conducir porque se han descrito casos de mareos en algunos pacientes, sobre todo al principio del tratamiento. Esto es aplicable también a la posibilidad de sufrir una caída.

Efectos Adversos

Los efectos adversos más frecuentes, que no significa que aparezcan siempre, son:

- Dolor de cabeza, insomnio.
- Gusto metálico.
- Molestias intestinales: Diarrea, náuseas.
- Mareos o trastornos del equilibrio.
- Infecciones de vías urinarias bajas

Contacte rápidamente con su médico si tuviese algún episodio de convulsiones durante el tratamiento

Interacciones

Fampridina se elimina principalmente por secreción renal, a través del transportador OCT2. Medicamentos que inhiben el OCT2 como carvedilol, propranolol y metformina se deben evitar en lo posible. Evitar asimismo otros que puedan también inducir convulsiones como tramadol o bupropion o plantas medicinales como el Ginkgo biloba.

Avisé a su médico o farmacéutico si va a tomar algún medicamento o preparado medicinal nuevo. También si se va a hacer una prueba radiológica con contraste iodados