

SABÍA  
QUE...

**Isavuconazol** es un agente antifúngico que actúa bloqueando la síntesis de ergosterol debilitando así la estructura del hongo. Está indicado en mucormicosis y en infecciones producidas por el hongo *Aspergillus*.



## Cómo debo tomarlo



Los dos primeros días debe tomar 200 mg (**2 cápsulas**) cada 8 horas. A partir de ahí debe tomar 200 mg (**2 cápsulas**) una vez al día. O sea las seis primeras tomas cada 8 horas y después cada 24 horas hasta el final del tratamiento. Pueden ser tratamientos largos y es muy importante que no lo abandone antes de que se lo indique su médico.

Tome las cápsulas con o sin alimentos pero enteras (sin abrirlas ni masticarlas) y respetando el horario: en toma diaria que sea más o menos a la misma hora.

Los tratamientos pueden ser largos. Es importante que **no los interrumpa** aunque se encuentre mejor.

### ¿Qué hacer si ha olvidado una dosis?

Es muy importante que no olvide ninguna toma, sobre todo en la dosis de carga, pero si así ocurre tómela lo antes posible. Si ya estuviese más cerca de la siguiente toma espere a ésta.

**NUNCA tome una dosis doble para compensar un olvido.**

### No tome isavuconazol si

Usted es alérgico a isavuconazol, a algún otro antifúngico del mismo grupo o a alguno de los componentes de las cápsulas.

Tiene un problema con el ritmo cardiaco llamado 'síndrome de QT corto'

En la lactancia

### Precauciones

Si tiene enfermedad hepática grave.

Si está **embarazada** consulte siempre a su médico. Él decidirá según el balance beneficio/riesgo. No hay evidencia de malformaciones pero tampoco hay experiencia de su uso en embarazo.

Tome precaución en caso de conducir o manejar maquinaria peligrosa los primeros días. No a todo el mundo le afecta, pero es bueno tomar precauciones al principio

Evite **exposiciones** prolongadas **al sol** o use protectores solares.

Los **efectos adversos** más frecuentes, que no significa que aparezcan en todos los pacientes, son:

- Náuseas, vómitos y diarrea
- Dolor de cabeza y mareos
- Hormigueo y pérdida de sensibilidad
- Alteración del gusto y sequedad de boca
- Palpitaciones (frecuencia cardiaca elevada)
- Mayor sensibilidad a la luz

**Avisé rápidamente a su médico** o póngase en contacto con nosotros en caso de:

Una reacción alérgica grave: (enrojecimiento de la piel, dificultad al respirar, etc.).

Signos de infección como fiebre > 38°C, escalofríos, tos, dificultad al orinar.

Si sufriera descamación grave de la piel, boca, ojos o genitales.

### Interacciones con otros medicamentos:

Isavuconazol presenta bastantes interacciones, con lo que es **muy importante que nos indique cualquier tratamiento** que le puedan recetar o vaya a tomar. A

modo de ejemplo, tiene interacciones con:

Antiepilépticos como fenitoina, carbamacepina o fenobarbital

Antituberculostáticos como rifampicina o rifabutina

Inmunosupresores: ciclosporina, tacrolimus, sirolimus o micofenolato

Algunas benzodiazepinas como midazolam

Antidiabéticos como metformina o pioglitazona.

Algunos opiáceos para el dolor

Corticoides como dexametasona o prednisona.

Otros: bupropion, colchicina, dabigatran, digoxina, etcétera

Medicamentos citostáticos y algunos para el VIH

Productos naturales como la hierba de San Juan

**No olvide consultar a su farmacéutico o médico  
si le recetan algún tratamiento nuevo**