

SABÍA
QUE...

Sobre su medicación

Ivermectina 6 mg cap. es una lactona usada en varios tipos de infecciones parasitarias tales como filariasis linfática, oncocercosis, estrogiloidiasis, ascariasis, pediculosis o escabiosis (sarna).

Datos de administración:

- En general son tratamientos cortos (a veces una dosis única o tratamientos de un día) y su médico le ajustará la dosis en relación a su peso y el tipo de infección que quiera tratar. Aténgase siempre a sus instrucciones.
- Se debe tomar **con agua y el estómago vacío**. No ingerir ningún alimento 2 horas antes y después de la dosis.

¿Qué hacer si olvida una dosis?

Tómelo tan pronto como se acuerde, salvo que quede poco tiempo para la próxima administración, en ese caso ignore la dosis olvidada. En tratamientos cortos tome justo el número de dosis que le hayan prescrito.

CONTRAINDICACIONES y PRECAUCIONES

Contraindicada en personas con hipersensibilidad al principio activo o a alguno de sus componentes: almidón de maíz y estearato de magnesio.

Debe evitar el consumo de alcohol durante el tratamiento porque puede hacer menos efecto.

Si está o puede estar embarazada o si está en periodo de lactancia, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

Efectos adversos:

Al ser un tratamiento corto son poco frecuentes, pero si aparecen suelen ser:

- Diarrea
- Náuseas o molestias abdominales
- Mareos
- Cefalea
- Cansancio
- Picor

Cuando se usa en oncocercosis puede dar hipotensión postural, por tanto levántese despacio de la cama o la silla.

Acuda a su médico si notase visión borrosa, dolor fuerte de cabeza o cuello y/o dificultad para caminar.

Interacciones con otros medicamentos:

Sobre todo en tratamientos tan cortos no se esperan interacciones relevantes. No obstante hay fármacos que pueden afectar a su metabolismo.

Evite tomar alcohol durante el tratamiento.

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle incluso aunque tenga síntomas similares a los suyos.

En el **tratamiento de la sarna** deberán seguir medidas higiénicas para prevenir la reinfección como mantener las uñas cortas y limpias. Además es importante seguir las recomendaciones para la limpieza de prendas de vestir y ropa de cama.

