

SABÍA QUE...

Ixekizumab (Taltz®) es un anticuerpo monoclonal humanizado recombinante de tipo IgG4 que se une con alta afinidad y de forma específica a la IL-17A. Concentraciones elevadas de IL-17A se asocian con la patogénesis de la psoriasis. La neutralización de la IL-17A por ixekizumab inhibe estas acciones. Como consecuencia directa, se reduce el eritema, así como la induración y descamación presente en las lesiones de la psoriasis en placas y artritis psoriásica. El objetivo del tratamiento es, además de aliviar la inflamación y el dolor, parar el curso de la enfermedad, por lo que es importante que no olvide ninguna toma.

Presentaciones y posología

Ixekizumab (Taltz®) se presenta en plumas precargadas de 80 mg.

La dosis va a depender de la patología, pero lo habitual en **psoriasis** es:

- **Semana 0:** 160 mg (**dos inyecciones** de 80 mg)
- **Semanas 2, 4, 6, 8, 10 y 12:** 80 mg (**una sola inyección**)
- **A partir de la semana 13:** Una dosis de mantenimiento de 80 mg cada cuatro semanas.

La pauta de administración puede variar de un paciente a otro, por lo que debe seguir exactamente las instrucciones dadas por su médico.

En **artritis psoriásica** la pauta de inicio es:

- **Semana 0:** 160 mg (**dos inyecciones** de 80 mg)
- **A partir de la semana 4:** 80 mg (**una sola inyección**) cada 4 semanas

No usar en caso de :

- Alergia a ixekizumab o alguno de sus componentes.
- Si padece una infección activa.
- Debe asegurarse de no padecer tuberculosis ni hepatitis B latentes. Le harán las pruebas necesarias, ya que si fuese así correría riesgo de infección grave.
- En caso de embarazo ni en caso de lactancia.
- Precaución en pacientes con trastornos psiquiátricos graves

Consejos:

- Consulte siempre a su médico en caso de tener que ponerse alguna **vacuna** o si le van a realizar una **intervención quirúrgica** o dental.
- Es muy importantes que se haga sus analíticas y vaya a sus revisiones con la frecuencia que su médico le indique.
- El tabaco puede provocar tanto que empeore la enfermedad como fracaso al tratamiento.
- Es importante también que siga hábitos saludables y realice ejercicio físico moderado con frecuencia tal como le hayan dicho.

Es importante que prepare la medicación en un espacio limpio y lleve a cabo los preparativos con **tranquilidad**, sin prisas. Y recuerde también que antes de la administración debe dejar la pluma fuera de la nevera alrededor de media hora. NO utilice NINGUNA FUENTE DE CALOR para ello

¿Cómo se administra?

La vía de administración de Taltz es **subcutánea**.

- Las mejores zonas para la inyección son aquellas en las que la piel es blanda y suave, y lejos de articulaciones, nervios o huesos. Por ejemplo, abdomen (evitando el área de 5 cm que rodea el ombligo), brazo, muslo o nalgas.
- Desinfecte la zona de la piel donde vaya a inyectarse.
- Alterne el punto de inyección y anótelos.
- No utilice regiones de la piel con hematomas, doloridas, infectadas o si presentan una herida abierta.



Siga exactamente las instrucciones del prospecto y tras la administración presionar con un algodón el sitio de inyección durante unos segundos y **no frotar**.

Si olvida una inyección, póngase la siguiente tan pronto como lo recuerde. Si se ha retrasado menos de 1 semana debe administrarse la dosis olvidada y mantener el calendario habitual. Si ha pasado más de 1 semana, póngase la dosis olvidada y establezca un nuevo calendario a partir de la nueva fecha. Nunca se administre una dosis doble (dos dosis el mismo día) para compensar dosis olvidadas.

Conservación

Conservar en nevera (2°C-8°C) y protegido de la luz. No congelar.

Es estable a una temperatura de 25°C máxima durante 5 días.

No utilizar después de la fecha escrita en el envase

Posibles efectos adversos que pueden aparecer

- Riesgo aumentado de infecciones leves: candidiasis oral, conjuntivitis, infecciones de vía respiratoria superior o tiñas. En caso de infecciones graves se debe interrumpir el tratamiento y reanudarlos una vez resueltos. En cualquier caso consulte a su médico al respecto.
 - Reacciones en el lugar de inyección (inflamación, dolor y enrojecimiento)
 - Dolor de garganta
 - Náuseas
- Consulte a su médico si presenta síntomas como erupción cutánea grave, fiebre persistente, cansancio generalizado, heridas que no cicatrizan o problemas dentales.