








	HORAS	8	Desayuno	11-12	Comida	17	Merienda	20	Cena	23	Al acostarse
											
											
		<p>Tome el comprimido entero después de una comida consistente. Si tiene que tomar protectores para el estómago póngase en contacto con su médico/farmacéutico.</p> <ul style="list-style-type: none"> Los IBP (omeprazol, pantoprazol, etc.) están contraindicados Los antiH2 (ranitidina, etc) deben espaciarse 12 horas <p>Con antiácidos: (Almax, Alka-Seltzer, Rennie,...) deberá espaciarlo 4 horas al menos.</p>									

Juluca contiene dos principios activos: dolutegravir y rilpivirina

Rilpivirina tiene interacciones con medicamentos como haloperidol, algunos antiarrítmicos, citalopram, algunos antiepilépticos, procinéticos como cisaprida o metadona; y drogas como la cocaína.

Dolutegravir tiene interacciones con medicamentos como rifampicina, algunos antiepilépticos, plantas como la hierba de san Juan o el fármaco usado en regímenes de adelgazamiento orlistat.

Está contraindicado su uso con el medicamento fampridina.

Se debe ajustar la dosis de metformina cuando se inicia o se termina tratamiento con dolutegravir.

Estos son sólo algunos ejemplos; si comienzas a tomar cualquier fármaco, complejo vitamínico, productos de herboristería, drogas recreativas, etcétera, **por favor consúltanos**. Independientemente de su beneficio o no beneficio hay algunas que no afectan a su tratamiento, otras que sí y otras que pueden ver alterado su efecto a causa del tratamiento antirretroviral.

LEE ATENTAMENTE ESTOS CONSEJOS

- **SI SE TE OLVIDA ALGUNA TOMA.....**
..... y no han pasado 12 horas, tómatela.
.....y hace más de 12 horas que te la tenías que haber tomado, sigue con tu horario normal pasando a la siguiente toma.
ii NUNCA TE TOMES EL DOBLE EN LA SIGUIENTE PARA COMPENSAR OLVIDOS!!
- **SI VOMITAS LAS PASTILLAS** intenta tomarlas de nuevo. Si ya ha pasado más de 30-40 minutos no lo haga, porque ya se habrá absorbido una cantidad significativa del fármaco.
Si ves que no puedes y te sucede con frecuencia explícaselo a tu médico o farmacéutico: existen formas de reducir los vómitos.
- Es muy importante incluir la toma de medicamentos en tu rutina de vida y hacerlo siempre a la **MISMA HORA**.