

SABÍA QUE...

Sobre su enfermedad

La fibrosis quística es una enfermedad crónica, hereditaria y degenerativa que afecta principalmente a los pulmones y el sistema digestivo.

Consiste en una alteración genética que afecta a las zonas del cuerpo que producen secreciones, dando lugar a un espesamiento y disminución del contenido de agua, sodio y potasio, originándose una obstrucción de los canales que transportan esas secreciones y permitiendo que dicho estancamiento produzca infecciones e inflamaciones.

Sobre su medicación

Ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor Kaftrio® en administración combinada con ivacaftor está indicado en el tratamiento de pacientes con fibrosis quística (FQ) mayores de 6 años o mayores homocigotos para la mutación *F508del* en el gen CFTR.

Cómo tomarlo

Siga las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico según edad y peso del paciente.

Edad	Dosis de la mañana	Dosis de la noche
6 a <12 años que pesan <30 kg	2 comprimidos de 37,5 mg de ivacaftor/25 mg de tezacaftor/50 mg de elexacaftor	1 comprimido de 75 mg de ivacaftor
6 a <12 años que pesan ≥30 kg	2 comprimidos de 75 mg de ivacaftor/50 mg de tezacaftor/100 mg de elexacaftor	1 comprimido de 150 mg de ivacaftor
≥12 años	2 comprimidos de 75 mg de ivacaftor/50 mg de tezacaftor/100 mg de elexacaftor	1 comprimido de 150 mg de ivacaftor

Tanto **Kaftrio®** como **Kalydeco®** se deben administrar por vía oral con alimentos con suficiente contenido graso: Se deben tomar una comida o un aperitivo que contenga grasas, justo antes o justo después de la administración. Es importante que el intervalo entre los comprimidos de la mañana y de la noche sea de 12 horas.



No debe tomar Kaftrio® si es **alérgico** a alguno de sus componentes

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

- Si se olvida una dosis y han transcurrido menos de 6 horas desde la hora a la que normalmente se lo toma debe tomar el comprimido lo antes posible y después seguir con el horario habitual.
- Si han transcurrido **más de 6 horas**:
 - Si **olvidó** la dosis **de la mañana** de Kaftrio, tómela en cuanto se acuerde. No tome la dosis de ivacaftor de la noche. Tome la siguiente dosis de la mañana a la hora habitual.
 - Si **olvidó** la dosis de ivacaftor **de la noche**, no tome la dosis olvidada. Espere al siguiente día y tome la dosis de la mañana de Kaftrio a la hora habitual.

NUNCA TOME UNA DOSIS DOBLE PARA COMPENSAR LA DOSIS OLVIDADA.

Reacciones adversas

Se suele tolerar bien, pero las más frecuentes que pueden aparecer son:

- Mareos (evitar conducir o manejar maquinaria peligrosa si se producen)
- Cefaleas y dolor de oído
- Congestión nasal
- Dolor abdominal
- Exantema (si notase erupción grave póngase en contacto con su médico)

Precauciones

Consulte a su médico si le han dicho que tiene enfermedad hepática o renal, ya que podrá ser necesario que su médico le ajuste la dosis de Kaftrio®.

Interacciones

Este fármaco tiene interacciones con determinados medicamentos, como ciertos antibióticos, anticonvulsivantes, antimicóticos, antimicobacterianos, anticonceptivos hormonales, inmunosupresores, hierba de san Juan, antiarrítmicos, anticoagulantes, hipoglucemiantes orales, hipolipemiantes o antihipertensivos. Evite los alimentos o bebidas que contengan pomelo, ya que pueden aumentar los efectos adversos de Kaftrio.

Es muy importante que consulte a su farmacéutico o médico antes de tomar un nuevo medicamento, complejo vitamínico o planta medicinal.