

SABÍA  
QUE...

## [ Sobre su enfermedad ]

La fibrosis quística es una enfermedad crónica, hereditaria y degenerativa que afecta principalmente a los pulmones y el sistema digestivo.

Consiste en una alteración genética que afecta a las zonas del cuerpo que producen secreciones, dando lugar a un espesamiento y disminución del contenido de agua, sodio y potasio, originándose una obstrucción de los canales que transportan esas secreciones y permitiendo que dicho estancamiento produzca infecciones e inflamaciones.

## [ Sobre su medicación ]

**Ivacaftor** (Kalydeco®) está indicado en el tratamiento de pacientes con fibrosis quística (FQ) mayores de 6 años de edad con un peso mayor a 25 kg y con alguna de las mutaciones de apertura del canal en el gen CFTR.

### Posología y forma de administración

La dosis recomendada en monoterapia es de un comprimido de ivacaftor 150mg por vía oral cada 12 horas (dosis diaria total de 300 mg de ivacaftor).

Kalydeco® también puede administrarse en tratamientos combinados con Kaftrio® y Symkevy®. Aténgase siempre a la pauta que le indiquen.

Se administra por vía oral con un intervalo de 12 horas entre ambas tomas. Se debe tomar una comida o un aperitivo que contenga grasas justo antes o justo después de la administración.



Debe evitar el zumo de pomelo si está en tratamiento con ivacaftor.

No debe tomar Kalydeco® si es **alérgico** a ivacaftor o alguno de sus excipientes

### ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

**Si se olvida una dosis** y han transcurrido menos de 6 horas desde la hora a la que normalmente se toma el comprimido, tomar el comprimido lo antes posible y después tomar la siguiente dosis a la hora programada normal. Si han transcurrido más de 6 horas debe esperar hasta la siguiente dosis.

**NUNCA TOME UNA DOSIS DOBLE PARA COMPENSAR OLVIDOS.**

### Reacciones adversas

Las más frecuentes que pueden aparecer son:

- Mareos (evitar conducir o manejar maquinaria peligrosa si se producen)
- Cefaleas y dolor de oído
- Congestión nasal, infecciones respiratorias
- Dolor abdominal, diarrea
- Exantema (si notase erupción grave póngase en contacto con su médico)

Consulte a su médico si le han dicho que tiene enfermedad hepática o renal, ya que podrá ser necesario que su médico le ajuste la dosis de Kalydeco®.

### Interacciones:

**Presenta bastantes interacciones que pueden afectar a la eficacia o provocar efectos adversos. A modo de ejemplo**

Antialérgicos (montelukast, fexofenidina)

Antibióticos (claritromicina, tetraciclinas, eritromicina, rifampicina,...)

Anticonvulsivantes (carbamazepina, fenobarbital, fenitoína),

Antifúngicos (itraconazol, ketoconazol, posaconazol, voriconazol, fluconazol),

Benzodiazepinas (midazolam, triazolam)

Antidepresivos (citalopram, escitalopram, bupropión)

Inmunosupresores (ciclosporina, everolimus, sirolimus, tacrolimus)

Protectores de estómago (omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, ranitidina,...)

Anticonceptivos orales, algún antiinflamatorio, anticoagulantes, digoxina, ciertos medicamentos para la diabetes, hierba de San Juan, etcétera

**Es muy importante que consulte a su farmacéutico o médico antes de tomar un nuevo medicamento, complejo vitamínico o planta medicinal.**