

SABÍA
QUE...

Linezolid es un antibiótico que tiene un espectro de actividad reducido, por lo que sólo debe utilizarse frente a gérmenes sensibles a linezolid

¿Cómo debo tomarlo?

Se administra por vía oral con o sin alimentos y habitualmente cada 12 h
Es **MUY IMPORTANTE** que el intervalo sea de 12 horas justas
Los comprimidos deben tragarse enteros con un vaso de agua sin masticar ni chupar en la boca ni disolverlos

¿Qué hacer si ha olvidado una dosis?

Si aún **NO han pasado 6 horas**, tome la dosis olvidada lo antes posible y continúe el tratamiento con el horario habitual

Si han pasado **más de 6 horas** desde el olvido, no tome la dosis olvidada y espere a la próxima toma

NUNCA tome una dosis doble para compensar un olvido

No tome linezolid si:

Es alérgico a LINEZOLID o a alguno de sus excipientes
Está embarazada o en periodo de lactancia

Precaución si padece

Hipertensión arterial (no controlada) o feocromocitoma
Síndrome carcinoide
Tirotoxicosis
Historial de convulsiones
Insuficiencia renal o hepática grave
La forma oral líquida puede contener fenilalanina. Hable con su médico antes de usarla si usted padece fenilcetonuria

Efectos adversos

Los efectos adversos más frecuentes, que no significa que aparezcan siempre, son:

- Dolor de cabeza, insomnio
- Gusto metálico
- Molestias gastrointestinales: diarrea, náuseas

Póngase en contacto con su médico si nota:

- Problemas de visión: en la agudeza visual, cambio en los colores
- Hormigueo o dolor de extremidades
- Piel pálida con sensación de desmayo y dificultad respiratoria
- Sangrado frecuente, hematomas o manchas en la piel rojas o moradas
- **Acidosis metabólica:** vómitos y diarrea frecuente, dolor abdominal o respiración acelerada
- **Síndrome serotoninérgico:** confusión, fiebre muy alta, sudoración, rigidez muscular, agitación, alucinaciones

Interacciones

LINEZOLID tiene bastantes interacciones, como por ejemplo:

- Antimigrañosos: ergotamínicos (muy frecuente), triptanos (menos frecuente)
- Antidepresivos: IMAO, tricíclicos, ISRS
- Simpaticomiméticos: broncodilatadores adrenérgicos, pseudoefedrina, fenilpropanolamina (ojo a los antigripales)
- Algunos opiáceos: petidina, fentanilo, dextrometorfano, tramadol
- Medicamentos contra los vómitos: metoclopramida, ondansetron, granisetron
- Algunas plantas medicinales: ginseng, hipérico
- Alimentos ricos en tiramina: carnes secas, ahumadas o encurtidas, quesos curados, chocolate, bebidas alcohólicas no destiladas, salsa de soja
- Suplementos como el triptófano

No olvide consultar a su farmacéutico o médico si le recetan algún tratamiento o preparado nuevo