

SABÍA
QUE...

[Sobre su medicación]

Molnupiravir es un profármaco antiviral que dentro del organismo se metaboliza a su forma activa: NHC, un análogo de la base citidina. Éste interfiere con el proceso de replicación del SARS-CoV-2 paralizándolo y haciendo que se controle la infección. Está indicado en pacientes ADULTOS con formas leves o moderadas de Covid-19 y que presenten factores de riesgo para desarrollar una infección grave.

Recuerde:

Que aunque esté en tratamiento debe seguir observando las medidas de prevención dictadas por las autoridades sanitarias para la propagación del virus, tales como medidas de aislamiento, uso de mascarillas y aplicación de soluciones desinfectantes cuando sea preciso

Datos de administración

La dosis recomendada es de 800 mg dos veces al día durante 5 días

Debe tomar **CUATRO** comprimidos de 200 mg cada **12** horas

Lo puede tomar con o sin alimentos pero debe haber 12 horas entre cada toma. Debe tomar los comprimidos enteros y con agua, sin romper, masticar o machacar. Es MUY IMPORTANTE completar los cinco días de tratamiento

Póngase alarmas para intentar que **no se olvide una dosis**. Pero si así ocurriera tómela tan pronto como se acuerde y continúe como antes. Si han pasado ya unas horas tómela lo antes posible e intente adaptar de nuevo las tomas cada 12 horas. Y si ya han pasado 10 horas espere a la próxima. **No tome nunca dosis doble** para compensar las olvidadas y termine siempre las diez dosis totales.

No tome LAGEVRIO® si...

- Si es alérgico a molnupiravir o a cualquiera de sus compuestos.
- Si está en edad de crecimiento. Molnupiravir no está indicado en menores de 18 años ya que puede afectar el crecimiento óseo y la formación de cartílagos
- No se necesitan ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal o hepática leve o moderada.

Embarazo y lactancia

- El uso de molnupiravir está asociado a riesgo fetal con lo que no debe usarse en embarazo. Las personas en edad fértil deben usar un método anticonceptivo eficaz mientras tome el tratamiento y al menos **cuatro días** después de la última dosis.
- No se recomienda amamantar durante el tratamiento con molnupiravir ni los 4 días posteriores a la última dosis de molnupiravir. Aconseje a las personas en período de lactancia que consideren interrumpir la lactancia y que consideren extraerse leche materna y desecharla durante el tratamiento y durante 4 días después de la última dosis de molnupiravir

Efectos adversos

En general se tolera muy bien, pero se han descrito en algunos casos:

- ✓ Trastornos gastrointestinales: diarreas o náuseas
- ✓ Mareos

Informe a su médico si notase que apareciera algún efecto adverso grave

Toma de MOLNUPIRAVIR con otros medicamentos

Aunque la experiencia clínica aún es escasa, no se esperan interacciones importantes con otros fármacos debido a su farmacocinética. En cualquier caso informe sobre la medicación que está tomando a su farmacéutico o médico.