

SABÍA
QUE...

Sobre su medicación

Paxlovid® es un medicamento compuesto por dos fármacos: **nirmatrelvir**, un inhibidor de la proteasa que inhibe la replicación del SARS-COV2, y **ritonavir**, que en este caso se comporta como un potenciador del efecto del primero, retrasando la eliminación hepática del mismo. Está indicado en casos de covid leves (cuando no requieran ingreso a causa de la enfermedad) y en pacientes inmunodeprimidos y no vacunados.

Sobre la forma de tomárselo

¡Es fundamental comenzar el tratamiento antes de los 5 días desde el contagio!

Debe tomar dos comprimidos de nirmatrelvir (PF-07321332) de 150 mg, de color rosa, y uno de ritonavir 100 mg, de color blanco, cada 12 horas y durante cinco días. Para hacerlo más fácil verá que el envase contiene 5 blísteres, uno por cada día de tratamiento. Si mira el reverso observará que la mitad del blíster es de color amarillo y corresponde a la dosis de la mañana (tres comprimidos en total) y la otra mitad de color azul correspondiente a la dosis nocturna (otros tres comprimidos).



Se puede tomar con o sin alimentos pero es importante que el tiempo transcurrido entre una dosis y otra sea de 12 horas lo más aproximadamente posible.

Si usted tiene algún problema de riñón puede ser que la dosis sea menor: cada 12 horas un comprimido igualmente de ritonavir pero **SÓLO UNO** de nirmatrelvir. Aténgase en cualquier caso a las indicaciones de su médico.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Son sólo cinco días y debe intentar que esto no ocurra, pero como norma si no han pasado aún 6 horas, tómela y siga con su pauta. Si han pasado más de 6 horas espere a la dosis siguiente. Después termine las 10 tomas que son el tratamiento total. No tome nunca dosis doble para compensar las olvidadas.

No tome si...

- Si es alérgico al nirmatrelvir, a ritonavir o a cualquiera de sus compuestos.
- Si tiene un problema hepático grave
- Precaución si padece insuficiencia renal. Su médico le **ajustará la dosis**

En cuanto al **embarazo y lactancia** parece que los beneficios superan a los hipotéticos riesgos

Efectos adversos

En general se tolera muy bien, pero se han descrito en algunos casos:

- Disgeusia (alteraciones del gusto pasajeras)
- Trastornos gastrointestinales (diarrea, náuseas)
- Se ha descrito algún caso de subida ocasional de la tensión arterial

Toma de PAXLOVID® con otros medicamentos

Este medicamento interacciona con un número elevado de medicamentos, haciendo en unos casos que el efecto terapéutico sea menor y en otros potenciar los efectos adversos. Hay algunos que deberá suspender durante el tratamiento con Paxlovid® y otros en los que le modificarán la dosis.

Es importante que no tome ningún medicamento por su cuenta (ni plantas medicinales) durante el tratamiento y los tres días posteriores

No olvide consultar a su farmacéutico o médico si le recetan algún tratamiento nuevo

Recuerde que ...

- ...Paxlovid® **no es un sustituto** de la vacuna.
- ...aunque haya iniciado tratamiento no debe relajar las medidas de prevención de contagios: aislamiento, mascarilla, correcto lavado de manos, evitar compartir artículos de uso personal, etcétera.