

SABÍA
QUE...

Praziquantel es un antiparasitario de amplio espectro, que está indicado en el tratamiento de muchas infecciones por trematodos, como *Schistosoma haematobium*, *S. mansoni*, *S. intercalatum*, *S. japonicum*, *S. mekongi*, y como alternativa terapéutica en otras formas de trematodos, cisticercosis y teniasis

¿ Cómo debo tomarlo ?

Son comprimidos recubiertos con película y se administran por **vía oral**. La dosis depende del tipo de infección, con lo que debe seguir lo que indique su médico. En caso una dosis única diaria se recomienda tomarlo por la noche. Si la administración es diaria y múltiple, el tiempo transcurrido entre cada una de las tomas no debe ser inferior a cuatro horas. Debe tomar los comprimidos con un buen vaso de agua, con comida, enteros, sin masticar ni romper, y tampoco los retenga en la boca. El sabor amargo que tienen pueden provocar náuseas.

Si tiene dificultades para tragar las pastillas, puede triturarlas y mezclarlas con algún líquido o comida semisólida como un yogur o una crema, pero debe tomarlo inmediatamente después de hacer la mezcla.

¿Qué hacer si se me olvida una dosis?

Tómela tan pronto como sea posible, pero si ya está cerca de la siguiente toma espere a ésta. No tome una dosis doble para compensar las olvidadas.

Precaución en:

En pacientes con insuficiencia hepática no compensada, insuficiencia renal grave, alteraciones del ritmo cardiaco, pacientes con antecedentes de crisis epilépticas o afectación del Sistema Nervioso.

Advierta a su médico si tiene nódulos (bultos) debajo de la piel.

Se puede usar en embarazo, pero se ha de tener precaución.

Hay pacientes que pueden sufrir mareos con el tratamiento. Si fuese así tenga cuidado a la hora de conducir o manejar maquinaria peligrosa.

No usar si:

Si tiene alergias al principio activo o a alguno de sus excipientes.

Si la infección es intraocular.

En período de lactancia.

Si ha tomado rifampicina recientemente consulte

Efectos adversos

Los más frecuentes, que no significa que aparezcan siempre, son:

- ✓ Dolor de cabeza
- ✓ Mareos
- ✓ Dolor gastrointestinal, abdominal y náuseas
- ✓ Urticaria
- ✓ Picor
- ✓ Alguna veces malestar general o fiebre

Interacciones

Presenta bastantes interacciones con otros medicamentos, como por ejemplo, Antifúngicos azólicos (ketoconazol, itraconazol,...)

Algunos antiepilépticos como carbamacepina, oxcarbacepina o fenitoina

Antibióticos como rifampicina o macrólidos (eritromicina, claritromicina)

Dexametasona

Cloroquina

Preparados medicinales como la hierba de San Juan o hipérico

Debe evitar tomar también zumo de pomelo.

¡¡ Si toma conjuntamente **albendazol** pueden cambiarle la dosis, y recuerde que éste debe tomarlo con una comida abundante para lograr una absorción adecuada !!

No olvide consultar a su farmacéutico o médico si le recetan algún tratamiento nuevo, planta medicinal, vitamina o cualquier otra cosa