

SABÍA  
QUE...

## ¿Qué es y para qué se utiliza ?

Este medicamento es un tratamiento antimicrobiano utilizado para tratar bacterias resistentes a algunos antibióticos, como los macrólidos. En la actualidad no se encuentra comercializado en España, por lo que se debe solicitar de manera individual a la AEMPS a través de medicación extranjera.

**PYOSTACINE®** es una mezcla de pristinamicina IA  $\geq 90\%$  y pristinamicina IIA  $\leq 10\%$ . Juntas actúan de forma sinérgica y tienen actividad bactericida.

## Horario de su tratamiento !

La dosis recomendada varía según indicación y paciente. De manera orientativa oscilan entre:

- 1 gramo (dos comprimidos de 500 mg) cada 12 - 8 horas vía oral.
- 2 gramos (cuatro comprimidos de 500 mg) cada 12 - 8 horas vía oral.

La duración de tratamiento también es variable y debe indicarla su médico. Debe tomarlo aproximadamente a la misma hora todos los días.

Tragar el comprimido completo preferiblemente acompañado de alimentos. Tomar enteros, pero si no puede tragarlos, es posible triturarlos y administrar con un poco de leche o alimentos semisólidos. En cualquier caso pregunte a su farmacéutico o médico.

## ¿Qué hacer si se ha olvidado una dosis?

En caso de que olvide una dosis, tómela lo antes posible, excepto si se encuentra más próxima la siguiente dosis que la olvidada.  
No tome una dosis doble para compensar la olvidada.

## ¿Qué hacer si vomita?

Si usted vomita en un plazo de 2 horas después de la administración de este medicamento, debe tomar un comprimido adicional. Si han pasado más de 2 horas, no es necesario tomar ninguna dosis adicional.

## Contraindicaciones y precauciones de uso

No usar si es alérgico a pristinamicina o en antecedentes de reacción pustulosa con pristinamicina.

En caso de embarazo o lactancia consulte siempre con su médico para que evalúe el riesgo/beneficio.

Precaución en enfermedad celíaca o cualquier otra alergia al trigo

## Posibles efectos adversos

- Alteraciones gastrointestinales (anorexia, náuseas, vómitos, molestias epigástricas y diarrea), glositis.
- Dolor articular o muscular
- Erupciones cutáneas

Generalmente son leves y remiten al poco tiempo. Póngase en contacto con su médico o farmacéutico si notase algo más grave como erupción pustulosa generalizada.

## Interacciones:

Evite la ingesta de zumo de pomelo.

Presenta interacciones con otros fármacos que se metabolizan por la misma vía, con lo cual puede verse afectada su eficacia o agravados los efectos adversos cuando se administren conjuntamente.

**Evitar la asociación con ciclosporina y tacrolimus, anticoagulantes y fármacos para tratar la gota.**

Debe **consultar siempre** con su farmacéutico o médico antes de tomar cualquier otro medicamento, incluidos los que no necesiten receta, productos de herboristería, suplementos dietéticos y plantas medicinales.