

Sobre su enfermedad

La hidrosadenitis supurativa o hidradenitis (HS) es una enfermedad inflamatoria crónica que se caracteriza por la aparición de nódulos dolorosos o abscesos en zonas intertriginosas (principalmente axilas, ingles, anogenital y debajo de las mamas en mujeres). Esta enfermedad puede progresar a un estado inflamatorio crónico y desarrollo de fistulas, supuración maloliente, fibrosis y cicatrices hipertróficas.

Entre los factores desencadenantes se encuentran la herencia genética como factor primordial y la presencia de otros factores como el tabaquismo, obesidad, alteraciones endocrinas, etc.

Sobre su tratamiento

La resorcina crema tópica al 15% se utiliza en el tratamiento de la HS de grado I y II por su efecto conjunto antiséptico y queratolítico (peeling) según ha demostrado en algunos estudios

Se recomienda, lógicamente, un abordaje general, tanto farmacológico como de hábitos personales (higiene, reducción del tabaquismo...).

Pauta y posología

La dosis habitual en adultos es de 1 – 2 aplicaciones diarias según el estado de la lesión. Su médico le indicará en cualquier caso su dosis exacta.

Si olvidó ponerse Resorcina15%:

Si ha pasado poco tiempo póngasela, pero en cambio si ya está más cerca de la siguiente administración espere

No administre nunca una dosis doble para compensar la dosis olvidada. Si tiene alguna otra duda sobre el uso de este producto, consulte a su médico o farmacéutico.

No usar

En caso de hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes: metabisulfito sódico, parabenos, glicerina, alcohol cetílico, cetearilsulfato sódico,..

Precauciones

- +No aplicar sobre mucosas/ojos, puede causar lesiones oculares. En caso de contacto con los ojos aclarar con abundante agua, manteniendo abiertos los párpados. Si persisten los dolores, acudir al oftalmólogo.
- +Evitar la exposición al sol de la zona tratada.
- +No recomendado en <2 años.
- +Evite el uso de productos para la piel que pueden causar irritación, como jabones ásperos, champús, o limpiadores de la piel, soluciones depilatorias o ceras, productos para la piel con alcohol, etc.
- +No aplicar en zonas lesionadas o heridas.
- +Evite el uso de otros medicamentos en las áreas que trate con resorcinol tópico, salvo que su médico le haya indicado hacerlo.



Efectos adversos: no quiere decir que aparezcan en todos los pacientes.

- +Hiperpigmentación de la piel en pieles oscuras.
- +Sensibilización cutánea (irritación, picor, enrojecimiento o descamación de la piel).
- +Si se aplica en el cuero cabelludo puede oscurecer el pelo.
- +En terapias prolongadas puede alterar la función tiroidea, producir mixedema o metahemoglobinemia.

Avisé rápidamente a su médico si tiene una **reacción alérgica grave**.

Interacciones:

Oxidantes como agua oxigenada o povidona yodada (Betadine) etc. No aplicar conjuntamente, ya que estos productos pueden provocar la oxidación de la resorcina y perder eficacia.

PROTEGER MUY BIEN DE LA LUZ

¡¡ Si toma un color parduzco tráigala para cambiarla si procede !!