

## ¿ Qué es y para qué se utiliza ?

**RIFATER** es una mezcla de tres fármacos (rifampicina, isoniazida y pirazinamida), y **MYAMBUTOL** contiene el principio activo etambutol. La combinación de todos se usa para la fase inicial del tratamiento de las infecciones por *Mycobacterium tuberculosis*.

### Posibles efectos adversos

Molestias gastrointestinales

Aumento del ácido úrico que no requiere intervención terapéutica.

Coloración de fluidos corporales como orina, lágrimas o sudor. Tener en cuenta si se utilizan lentes de contacto.

Cambios en el ciclo menstrual en tratamientos prolongados.

Sequedad de piel y boca y alteraciones del gusto. Es conveniente mantener una buena ingesta de líquidos y usar cremas hidratantes si hiciera falta.

Dolores de hueso, sobre todo de hombros en tratamientos largos.

### Los siguientes efectos adversos son muy raros, pero de ocurrir debe ponerse en contacto con su médico:

Diarrea persistente o aparición de sangre o moco en las heces

Hormigueo, entumecimiento o temblores en las extremidades

Sangrado frecuente

Alteraciones de la visión

Cansancio inusual

Confusión mental o alucinaciones

Aftas bucales extendidas

Coloración amarilla de piel u ojos

Síntomas de reacción alérgica grave.

### Interacciones:

Este medicamento presenta muchas interacciones con otros fármacos e incluso con productos de herboristería. Es **MUY IMPORTANTE** que consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar cualquier otro medicamento, incluidos los que no necesiten receta, productos de herboristería o suplementos dietéticos.

### Precauciones:

Si ha sufrido hepatitis inducida por fármacos

Si tiene artritis gotosa

No usar en caso de alergia a alguno de sus componentes

Evitar la exposición excesiva al sol o usar protección. Alguno de los fármacos puede hacer que su piel sea más sensible a los rayos.

## ¡ Horario de su tratamiento !

	AL LEVANTARSE	DESAYUNO		COMIDA	MERIENDA		CENA	ANTES DE ACOSTARSE						
Tratamiento	8	9	10	11-12-13	14	15	16	17	18	19-20	21	22	23	24

Tome los 5 comprimidos de Rifater juntos en ayunas por la mañana, pero si no lo tolera puede intentar tomarlos después de un desayuno ligero (poca cantidad y que no sea graso). Los 3 de Myambutol los puede tomar con los de Rifater en ayunas o bien en el desayuno

Si toma un antiácido (Almax, Bicarbonato, Alka-Selzer, Rennie,...): hágalo 3-4 horas antes o 3-4 horas después de tomar Rimstar®.

Si toma protector de estómago del grupo de los inhibidores de la bomba de protones (Ejemplo: omeprazol, pantoprazol,...) tómelo en el desayuno.

Debe evitar o limitar la ingesta de alcohol durante el tratamiento.

### ¿Qué hacer si se ha olvidado una dosis?·

En caso de que olvide una dosis, tómela lo antes posible, pero si ya está próxima la siguiente dosis espere a ésta y no la tome

No tome una dosis doble para compensar un olvido.

### ¿Qué hacer si vomita?

Si usted vomita en un plazo de 2 horas después de la administración de este medicamento debe tomar una dosis adicional. Si han pasado más de 2 horas, no es necesario tomar nada.

**R**ecuerde que durante el tratamiento, debe utilizar métodos anticonceptivos de barrera como el preservativo. Y debe usarlo hasta 30 días después de la última pastilla.