

SABÍAS QUE...

Siponimod (Mayzent) está indicado en el tratamiento de la **esclerosis múltiple secundaria progresiva** con actividad inflamatoria. Se trata de un modulador del receptor de la esfingosina, que en última instancia provoca un descenso de la actividad inflamatoria, y un freno a la progresión de la discapacidad y la aparición de nuevas lesiones.

Posología

Siponimod se administra por vía oral, preferiblemente por las mañanas. A usted le harán un estudio para determinar el estado metabolizador del CYP2C9. Así, si usted tiene el genotipo *3*3 no debe tomar el medicamento, si usted tiene el genotipo *1*3 o *2*3 debe usar una dosis de mantenimiento de 1 mg cada 24 horas y para el resto de genotipos la dosis de mantenimiento será la dosis plena de 2 mg.

En cualquier caso las primeras dosis se deben administrar de forma gradual para evitar efectos adversos en el corazón tal como se indica en la imagen:



A partir del día 6 la dosis será de un comprimido de 2 mg salvo si tiene los genotipos *1*3 o *2*3 que será tomará solo un comprimido de 1 mg.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

- Si está aún en los 6 primeros días y olvida una dosis debe empezar desde el principio. Si aun **NO han pasado 6 horas** del horario habitual tome la dosis olvidada lo antes posible y continúe el tratamiento.

- En la fase de mantenimiento debe tomar la dosis si aún no han pasado **más de 12 horas** desde el olvido, en caso contrario no tome la dosis olvidada y espere a la próxima toma. **NUNCA** tome una dosis **doble** para compensar un olvido.

Si está en fase de mantenimiento y deja el tratamiento más de 4 días debe volver a empezar como si fuese la primera vez que lo toma, con la fase de aumento progresivo.

Interacciones

Siponimod posee **muchas interacciones** con otros medicamentos, tanto a nivel farmacocinético (aumentando o disminuyendo los niveles en sangre de uno u otro fármaco) como a nivel de efectos sobre el corazón.

Es muy importante que **COMUNIQUE SIEMPRE** a su farmacéutico o a su médico cualquier medicamento nuevo que vaya a tomar, así como productos de herboristería o preparados vitamínicos.

No use Mayzent si :

- Si es alérgico al siponimod, a la soja o al cacahuete.
- Pacientes con un genotipo CYP2C9 *3*3 homocigóticos
- Tiene una infección grave activa o una infección crónica activa como hepatitis o tuberculosis o un tumor maligno activo.
- Tiene problemas graves del hígado.
- Padece insuficiencia cardíaca o enfermedad que afecte al ritmo cardíaco.
- Ha sufrido un infarto o angina de pecho en los últimos 6 meses.
- Si padece apnea del sueño
- Si está embarazada

Precaución:

- * Debe evitar el uso de vacunas vivas atenuadas debido al riesgo de infección y preguntar a su médico ante cualquier otra vacunación.
- Mujeres en edad fértil deben usar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento.
- Antes de iniciar la lactancia materna, consulte con su médico.
- Puede tener una respuesta inmunitaria algo disminuida: aumente las medidas de higiene.
- Si es padece usted hipertensión debe controlar al principio los valores de TA.
- Los comprimidos contienen lactosa.

Efectos Adversos

Los efectos adversos más frecuentes, que no significa que aparezcan siempre, son:

- Frecuentes: dolor de cabeza, aumento de la tensión arterial y aumento de los valores de las enzimas hepáticas.
- También puede notar, aunque ya con menos frecuencia, infecciones como herpes con más frecuencia, mareos, diarrea, debilidad, dolores de extremidades o hinchazón de piernas. Comuníquelo si perduran en el tiempo.

Unos síntomas que son muy raros pero que en caso de aparecer debe ponerse en contacto inmediatamente con su médico son: signos de infección grave como fiebre alta con dolor de garganta y úlceras bucales, dolor de cabeza muy fuerte con rigidez de nuca e hipersensibilidad a la luz, convulsiones o alteraciones graves del ritmo cardíaco.

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.