

SABÍA  
QUE...

**Tedizolid** es un antibiótico que actúa deteniendo el crecimiento bacteriano, con un espectro de actividad reducido, por lo que solo debe utilizarse frente a gérmenes que se sepa que sean sensibles.



## Cómo debo tomarlo



Se administra por vía oral una vez al día y con el estómago vacío (1 hora antes de las comidas) o una comida con bajo contenido en grasas. Es **MUY IMPORTANTE** tomarlo siempre a la misma hora aproximadamente. La duración del tratamiento suele ser de 6 días, pero depende de la infección a tratar. Tómela durante el tiempo exacto que le indique su médico.

Los comprimidos deben tragarse enteros con un vaso de agua, sin masticar, ni chupar en la boca, ni disolverlos.

## ¿Qué hacer si ha olvidado una dosis?

Si aún **NO han pasado 8 horas**: tome la dosis olvidada lo antes posible y continúe el tratamiento con el horario habitual.

Si han pasado **más de 8 horas** desde el olvido tómela y cambie el horario a partir de ese momento o espere a la siguiente toma.

**NUNCA** tome una dosis doble para compensar un olvido.

## No tome Sivextro si:

Si usted es alérgico a TEDIZOLID o a alguno de los excipientes.

## Precauciones:

En embarazo o lactancia habrá que valorar el beneficio/riesgo

Si tiene bajo el número de neutrófilos puede que le haga menos efecto.

Si tiene en general problemas hematológicos

Si ha padecido diarreas por Clostridium difficile

## Efectos adversos más frecuentes:

Los efectos adversos más frecuentes, que no significa que aparezcan siempre, son:

- Dolor de cabeza o mareos.
- Cansancio
- Molestias intestinales: Diarrea, náuseas
- Picor generalizado

## Póngase en contacto con su médico si nota:

- Problemas de visión: agudeza visual, cambio en los colores...
- Hormigueo o dolor de extremidades
- Sangrado frecuente, hematomas o manchas debajo de la piel rojas o moradas
- **Acidosis metabólica**: vómitos y diarrea frecuente, dolor abdominal o respiración acelerada.
- **Síndrome serotoninérgico**: confusión, fiebre muy alta, sudoración, rigidez muscular, agitación, alucinaciones, etcétera.

## Interacciones:

TEDIZOLID tiene bastantes interacciones. A modo de ejemplo

Antimigrañosos: Muy frecuente: ergotamínicos. Menos frecuente: triptanos.

Antidepresivos: IMAO, tricíclicos, ISRS

Simpaticomiméticos: broncodilatadores adrenérgicos, pseudoefedrina, fenilpropanolamina (ojo a los antigripales)

Algunos opiáceos: petidina, bupiriona, fentanilo, dextrometorfano, tramadol.

Medicamentos para evitar vómitos: metoclopramida, ondansetron, granisetron

Algunas plantas medicinales: Ginseng, hipérico

Alimentos ricos en tiramina: carnes secas, ahumadas o encurtidas, quesos curados, chocolate, bebidas alcohólicas no destiladas, salsa de soja.

Suplementos como el triptófano.

**Es MUY IMPORTANTE consultar a su farmacéutico o médico si le recetan algún tratamiento o preparado nuevo**