

SABÍA
QUE...

Teriflunomida es una sustancia con efectos antiinflamatorios e inmunomoduladores que actúa frenando el daño neuronal en pacientes con esclerosis múltiple remitente-recurrente.



Cómo debo tomarlo



- La dosis normal es un comprimido entero al día, con o sin alimentos, pero siempre a la misma hora del día.
- Los comprimidos deben tragarse enteros con un vaso de agua, sin masticar, ni chupar en la boca, ni disolverlos.

¿Qué hacer si ha olvidado una dosis?

Si aún **NO han pasado 12 horas**: tome la dosis olvidada lo antes posible y continúe el tratamiento con el horario habitual.

Si han pasado **más de 12 horas** desde el olvido: No tome la dosis olvidada y espere a la próxima toma.

NUNCA tome una dosis doble para compensar un olvido.

Teriflunomida y embarazo

En el embarazo o lactancia: Usted no debe quedarse embarazada ni amamantar a su hijo mientras reciba el tratamiento.

Debe utilizar un método anticonceptivo eficaz durante y después del tratamiento con teriflunomida.

Si a pesar de eso un análisis confirma que está embarazada póngase en contacto inmediatamente con su médico. Él puede sugerirle la forma de acelerar la eliminación de teriflunomida de la sangre para reducir los riesgos para el bebé.



Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.

No debe tomar teriflunomida

Si es alérgico al principio activo o algún excipiente.

Precaución si

Si usted padece insuficiencia hepática o renal grave.
Si padece algún tipo de neuropatía periférica
Hipertensión arterial no controlada
Los comprimidos de Aubagio contienen lactosa

Efectos adversos

En general se tolera bastante bien, pero hay descritos algunos efectos adversos:

- Molestias gastrointestinales (diarrea, náuseas..) sobre todo al principio.
- Fragilidad capilar que suele remitir a los 30-60 días
- Necesidad de orinar con más frecuencia
- Ligera pérdida de peso.
- Aumento transaminasas hepáticas en algunos casos.

Su médico le solicitará controles periódicos, sobre todo al inicio, para comprobar cómo está su hígado. Asimismo debe **controlarse la tensión arterial** periódicamente.

Póngase en contacto con su médico si notase:

Color amarillento en los ojos o piel, orina más oscura de lo normal y/o dolor abdominal persistente.

Interacciones con otros medicamentos:

No tiene demasiadas interacciones con otros fármacos.

No obstante precaución con:

- Otros inmunosupresores
- Anticoagulantes orales

Ojo también con otros fármacos que puedan ser hepatotóxicos

En cualquier caso informe a su farmacéutico o médico si le prescriben algún medicamento o preparado medicinal nuevo.