

SABÍA
QUE...

A usted le han indicado **voriconazol** para el tratamiento de una infección producida por hongos

¿Cómo debo tomarlo ?

La pauta prescrita por su médico es la siguiente: _____. Debe tomarlo sin alimentos, es decir, 1 hora antes o dos horas después de comer. Los comprimidos deben tragarse enteros, con un vaso de agua, sin triturar, sin masticar, ni chupar en la boca, ni disolverlos.

Mantenga siempre el mismo horario y es muy importante que el intervalo entre tomas sea de 12 horas.

¿Qué hacer si ha olvidado una dosis?

Si aún **NO han pasado 6 horas**: tome la dosis olvidada lo antes posible y continúe el tratamiento con el horario habitual.

Si han pasado **más de 6 horas** desde el olvido: No tome la dosis olvidada y espere a la próxima toma.

NUNCA tome una dosis doble para compensar un olvido.

No tome voriconazol si

Si usted es alérgico a voriconazol, así como alguno de los componentes de los comprimidos.

Si está embarazada o en periodo de lactancia.

Precauciones

Si tiene enfermedad hepática grave o cardíaca.

Adopte medidas anticonceptivas si usted o su pareja puede quedarse embarazada y manténgalas hasta **6 meses** tras haber finalizado el tratamiento.

Es **muy importante protegerse del sol** con ropa adecuada y crema con filtro solar de protección superior a 15, así como protegerse los ojos.

Los **efectos adversos** más frecuentes, que no significa que aparezcan en todos los pacientes, son:

- Náuseas, vómitos y diarrea
- Dolor de cabeza
- Febrícula
- Erupción cutánea
- Hinchazón de las extremidades
- Alteraciones visuales (visión borrosa u otros problemas oculares)
- Alteraciones hepáticas (dolor de tripa, color amarillento en ojos y piel u orina oscura).

Avisé rápidamente a su médico o póngase en contacto con nosotros en caso de:

Una reacción alérgica grave: (enrojecimiento de la piel, dificultad al respirar, etc.).
Signos de infección como fiebre > 38°C, escalofríos, tos, dificultad al orinar.
O cualquiera de los síntomas explicados anteriormente que no remitan.

Interacciones:

Voriconazol presenta muchísimas interacciones, con lo que es **muy importante que nos indique cualquier tratamiento** que le puedan recetar o vaya a tomar. A modo de ejemplo, tiene interacciones con:

Antiepilépticos como fenitoina, carbamacepina o fenobarbital

Antituberculostáticos como rifampicina o rifabutina

Inmunosupresores: ciclosporina, tacrolimus o sirolimus.

Anticoagulantes: Warfarina, acenocumarol

Algunas benzodiazepinas como alprazolam o midazolam

Anticonceptivos orales

Anticoagulantes orales

Antimigrañosos: alcaloides ergotamínicos para la migraña

Algunos opiáceos para el dolor

Corticoides inhalados y algunos orales como metilprednisolona.

Otros: Estatinas para el colesterol, amiodarona, tamsulosina, eplerenona, diltiazem, clopidogrel, ticagrelor, etcétera

Productos naturales como la hierba de San Juan o hipérico.

No olvide consultar a su farmacéutico o médico si le recetan algún tratamiento nuevo