

¿Qué es y para qué se utiliza ?

Este medicamento se emplea como tratamiento para la hepatitis C, que es una infección del hígado ocasionada por un virus.

ZEPATIER® es una combinación de dos principios activos (elbasvir y grazoprevir) que actúan inhibiendo la replicación del virus y la formación de nuevos viriones por distinto mecanismo de acción.

Posibles efectos adversos

En general se tolera muy bien (nada que ver con los antiguos tratamientos); no obstante podría aparecer:

- Dolor de cabeza o mareos
- Anemia
- Cansancio
- Reacciones alérgicas
- Erupciones cutáneas o prurito
- Aumento de la sensibilidad a la luz

Interacciones:

Evite la ingesta de zumo de pomelo. Presenta interacciones con más fármacos, por ejemplo anticonvulsivantes, algunos fármacos para el colesterol, algunos anticoagulantes, etcétera, por lo que debe **consultar siempre** con su farmacéutico o médico antes de tomar cualquier otro medicamento, incluidos los que no necesiten receta, productos de herboristería, suplementos dietéticos y plantas medicinales.

Contiene lactosa.

No utilizar después de la fecha escrita en el envase.

Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Devuelva la medicación sobrante a la Farmacia del Hospital.

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos.

Este díptico **NO** contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento.



Horario de su tratamiento



	Al levantarse	Desayuno		Comida	Merienda		Cena	Antes de acostarse
	8	9 10	11-12-13	14 15 16	17 18	19-20	21 22	23 24
Tratamiento								
ZEPATIER: tomar 1 comprimido al día, a la misma hora.								

La dosis recomendada es de 1 comprimido una vez al día, generalmente durante 12 semanas aunque su médico le puede indicar otra cosa. Debe tomarlo aproximadamente a la misma hora todos los días.

Tragar el comprimido completo acompañado o no de alimentos, sin masticar ni partir. En caso de tener problemas para tomarlo informe a su médico o farmacéutico.

¿Qué hacer si se ha olvidado una dosis?

En caso de que olvide una dosis, tómela lo antes posible, excepto si se encuentra más próxima la siguiente dosis que la olvidada.

No tome una dosis doble para compensar la olvidada.

¿Qué hacer si vomita?

Si usted vomita en un plazo de 2 horas después de la administración de este medicamento, debe tomar un comprimido adicional. Si han pasado más de 2 horas, no es necesario tomar ninguna dosis adicional.